

Pericolul de la *Microtus arvalis*

Автор(и): Растителна защита
Дата: 14.04.2022 Брой: 4/2022



La începutul lunii aprilie, în unele dintre zonele de câmp ale țării, au căzut precipitații între 10-20 l/m² (Karnobat – 10 l/m², Lovech – 11 l/m², Kazanlak – 12 l/m², Kyustendil – 12 l/m², Vratsa – 14 l/m², Sofia – 17 l/m², Shumen – 18 l/m², Dobrich – 20 l/m², Ruse – 21 l/m²), ceea ce a îmbunătățit umiditatea solului și condițiile pentru dezvoltarea culturilor agricole.

Până la mijlocul lunii, procesele de vegetație la culturile de cereale de toamnă și etapele inițiale de dezvoltare ale culturilor de primăvară semnate până acum vor avea loc la temperaturi medii zilnice în jurul și peste normă. La grâu și orz, stadiul de încălțare va fi observat pe scară largă. În anumite zone ale Câmpiei Dunării, va avea loc o trecere de la încălțare la înălțarea tulpinii, iar în unele locuri din sudul Bulgariei (stațiile agro Lyubimets și Haskovo) va începe stadiul de înălțare a tulpinii.

Suprafața cultivată cu culturi semănate toamna în regiunea Dobrich este de aproximativ 1.325.000 de decare. Dintre acestea, aproape 1.200.000 de decare sunt semănate cu grâu, 56.000 de decare cu orz și aproape 72.000 de decare cu rapiță. În ciuda precipitațiilor din toamnă și iarnă, cantitatea de umiditate a solului este insuficientă. Se așteaptă mai multe precipitații, astfel încât atât culturile de cereale, cât și noua recoltă de porumb și floarea-soarelui să se poată dezvolta mai bine.

Temperaturile scăzute din februarie și martie au împiedicat dezvoltarea majorității bolilor la culturi. Cu toate acestea, în zonele de nord-est ale regiunii Dobrich, se observă șoarecele comun de câmp. Până la 2 colonii pe decar ale acestui dăunător au fost înregistrate în câmpurile cu porumb ca cultură precedentă.

Inspectați în mod regulat culturile pentru șoarecele comun de câmp

La rapiță, va continua formarea ramurilor. La speciile pomicole, vor fi observate stadiile de umflare a mugurilor, formare a mugurilor și înflorire.

La vița de vie, vor continua curgerea sevei și umflarea mugurilor. La începutul celei de-a doua jumătăți a perioadei, în unele dintre zonele de câmp, se prognozează temperaturi minime negative și există riscul unor posibile daune la pomii fructiferi care au intrat în stadiul de înflorire.

În regiunile din estul și centrul Bulgariei, unde se prognozează precipitații de semnificație agronomică, condițiile vor limita posibilitățile de desfășurare a activităților sezoniere – lucrări de sol și semănături de culturi de primăvară, precum și tratamente pre-inflorire la culturile perene.