

Proгноză agrometeorologică pentru luna mai

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.05.2022 Брой: 5/2022



În prima decadă a lunii mai, dezvoltarea culturilor agricole va decurge într-un ritm mai lent, cu temperaturi medii zilnice sub normele climatice. La începutul lunii, în câmpiile din bazinul superior, nu poate fi exclusă posibilitatea formării înghețului, ceea ce trebuie luat în considerare la transplantul răsadurilor de legume.

După condițiile neobișnuit de uscate pentru începutul primăverii, precipitațiile din a doua jumătate a lunii aprilie, care au depășit 50–60 l/m² în multe zone ale țării, au contribuit la depășirea deficitului de umiditate a solului la culturile semănate toamna. Precipitațiile prognozate în prima decadă a lunii mai vor menține niveluri bune ale rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 cm – peste 75–80% din capacitatea de câmp. Aceste precipitații vor avea un efect favorabil asupra culturilor de cereale de toamnă, care se află în stadiul reproductiv al dezvoltării, cu cerințe crescânde de umiditate a solului. În prima decadă, grâul va trece prin stadiul de înălțare a

tulpinii, trecerea la înspicare și începutul înspicării în culturile din unele locuri din Câmpia Dunării și din regiunile extreme sudice.

După vremea răcoroasă pentru sezon din prima jumătate a celei de-a doua decade, se prognozează o îmbunătățire, cu normalizarea condițiilor termice și accelerarea proceselor vegetative la culturile agricole.

În majoritatea zilelor din a doua jumătate a lunii mai, dezvoltarea cerealelor de toamnă și a culturilor primăvăratice semănate va decurge într-un ritm accelerat, sub temperaturi peste normal. La porumb și floarea-soarelui va avea loc formarea frunzelor. La sfârșitul lunii mai, la floarea-soarelui semănată în termenele agrotehnice, se va observa formarea inflorescenței.

În a treia decadă, se așteaptă precipitații cu semnificație economică, care vor asigura cerința crescută de apă a culturilor de cereale de toamnă, la care va avea loc formarea și umplerea boabelor. În această perioadă, se prognozează o probabilitate de grindină și un risc de avariere a culturilor agricole. Pentru culturile pomicole și legumicole afectate de grindină, se recomandă efectuarea unui tratament cu fungicide cuprifere la prima ocazie, pentru a accelera cicatrizarea și a reduce riscul de infecții secundare.

Precipitațiile frecvente din mai vor fi o premisă pentru creșterea fondului de infecție al unei serii de boli fungice: ruginile (maro, neagră și galbenă), patul septoriozic și fuzarioza la grâu; manelele la culturile legumicole și la viță de vie; arsura florilor (putregaiul brun timpuriu) și găurirea la speciile cu sâmbure lemnos, și poala la speciile cu sâmbure pomicos.

Condiții mai potrivite pentru efectuarea stropirilor de protecție a plantelor vor apărea în a doua decadă a lunii mai, când se prognozează o probabilitate scăzută de precipitații.

Sursa: INMH