

Proгноza agrometeorologică pentru luna iunie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.06.2022 Брой: 6/2022



La începutul lunii iunie, dezvoltarea culturilor agricole va avea loc în condiții de temperaturi peste normal și, în multe zone ale țării, în condiții de rezerve de umiditate a solului nesatisfăcătoare pentru sezon. În urma secetei formate în luna mai, precipitațiile căzute la sfârșitul lunii au fost locale. În anumite locuri din regiunile extreme sudice, s-au înregistrat ploi intense și zone inundate cu culturi agricole, în timp ce în unele părți ale Câmpiei Dunării și în regiunile centrale și sud-estice, precipitațiile din mai au fost insuficiente pentru a depăși deficitul de umiditate a solului la culturile de primăvară și parțial la cele de toamnă. În aceste regiuni, în unele locuri, nivelul rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 cm la culturile de cereale de toamnă este scăzut – sub 60% din capacitatea de câmp (stațiile agrometeorologice Băzovec, Knezha, Novachene, Sliven).

La mijlocul primei decade a lunii iunie, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare. Până la sfârșitul primei și în majoritatea zilelor celei de-a doua decade, acestea vor fi determinate de vreme instabilă și temperaturi apropiate de normele climatice. În această perioadă, se prognozează precipitații de semnificație economică, o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 cm și a condițiilor pentru dezvoltarea culturilor agricole. Până la sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decade, grâul va fi în faza de umplere a bobului și în faza de coacere lăptoasă, în principal în culturile din regiunile sudice și în unele locuri din Câmpia Dunării (Băzovec). În perioada inter-fazică umplere bob – coacere lăptoasă, pagube la grâu sunt cauzate de larvele de ploșniță-soarelui, ceea ce necesită inspecția teren a culturilor și, atunci când densitatea dăunătorului depășește pragul economic de dăunare (2 larve/m²), tratamentul la timp.

În a treia decadă, dezvoltarea culturilor agricole va avea loc într-un ritm mai accelerat, în condiții de temperaturi în jurul și peste cele obișnuite pentru sfârșitul lunii iunie. În această perioadă, grâul va fi predominant în faza de coacere. La sfârșitul lunii, o parte din culturile de primăvară vor intra în stadiile reproductive ale dezvoltării: la floarea-soarelui se va observa începutul înfloririi, iar la hibridii timpurii de porumb – înălțarea și înflorirea mănuchiului. În iunie, valorile prognozate ale temperaturilor maxime, în intervalul 34-37°C, vor avea un impact negativ asupra înfloririi și fertilizării la culturile legumicole din producția de câmp mai târzie.

Vremea instabilă din cea mai mare parte a lunii va crea condiții pentru dezvoltarea unei serii de boli fungice: putregaiul brun târziu la soiurile târzii de cireș, tăciunea și făinarea la pomii fructiferi, mană la viță de vie și culturi legumicole. Condiții mai potrivite pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor vor apărea la începutul primei, la începutul și mijlocul celei de-a doua, și în a doua jumătate a celei de-a treia decade, în orele mai răcoroase ale zilei.

În iunie, probabilitatea grindinei rămâne crescută. După o furtună cu grindină, culturile de fructe și legume afectate ar trebui tratate cu fungicide care conțin cupru la prima ocazie (de preferință în termen de 48 de ore după eveniment).

Sursa: INMH