

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.07.2022 Брой: 7/2022



La începutul lunii iulie, dezvoltarea culturilor agricole va decurge în condiții de temperaturi peste normal și, în majoritatea țării, cu rezerve bune de umiditate în stratul de sol de 50 și 100 cm, ca urmare a precipitațiilor peste normal din luna iunie, care în multe locuri au depășit 80-100 l/m² (Vrața – 169 l/m², Montana – 91 l/m², Șumen – 113 l/m², Sofia – 153 l/m², Plovdiv – 110 l/m², Sliven – 98 l/m², Burgas – 95 l/m²).

După vremea caldă din primele zile ale lunii, se prognozează o normalizare a condițiilor termice la sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decade. În această perioadă se așteaptă precipitații de importanță agronomică, care vor menține niveluri bune ale rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 cm – peste 75% din capacitatea de câmp. Aceste precipitații vor avea o importanță semnificativă pentru porumb și floarea-soarelui, care se află în stadiul reproductiv al dezvoltării, cu cerințe ridicate de umiditate a solului (la porumb, în perioada dintre înflorire și maturitatea lăptoasă, consumul zilnic de apă atinge 6-7 m³/decare). Până la mijlocul lunii iulie, vegetația culturilor de primăvară va decurge în ritmuri moderate, în condiții termice apropiate de cele

obișnuite. La porumb, în funcție de precocitate, se vor observa diferite stadii: formarea frunzelor, înflorirea, înflorirea mănunchiului și formarea șuvițelor. La floarea-soarelui, în zonele de câmp, va predomina stadiul de înflorire, iar în culturile din câmpurile mai înalte – stadiul de formare a inflorescenței.

În majoritatea zilelor din a doua jumătate a lunii iulie, dezvoltarea culturilor agricole va decurge în ritmuri accelerate, la temperaturi peste normele climatice. La începutul celei de-a treia decade, o parte din hibrizii de porumb timpurii din zonele de câmp vor intra în stadiul de maturitate lăptoasă. La floarea-soarelui, va avea loc formarea și umplerea semințelor. La sfârșitul lunii, în culturile de floarea-soarelui semănate în termenul agrotehnic, în unele locuri din Câmpia Dunării (stațiile agrometeorologice Băzoveț, Cneaja, Novacene) și în regiunile de sud-est, se va observa începutul stadiului de coacere.

Vremea uscată, caldă și caniculară prognozată în a treia decadă va limita dezvoltarea unei serii de boli fungice, cu excepția făinării pe culturile legumicole, pomii fructiferi și vița de vie. În culturile pomicole, este recomandabil ca protecția plantelor împotriva bolilor să fie combinată cu combaterea generației a doua a moliilor fructelor, iar la vița de vie – împotriva larvelor generației a doua a moliei viței de vie. Condiții pentru efectuarea pulverizărilor de protecție a plantelor vor fi disponibile la începutul lunii iulie, în a doua jumătate a celei de-a doua decade și în majoritatea zilelor celei de-a treia decade. Tratamentele împotriva bolilor și dăunătorilor trebuie efectuate în orele mai răcoase ale zilei, cu produse care au un interval pre-recoltă adecvat, în concordanță cu perioada de coacere a culturilor.

Sursa: INMH