Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

În septembrie – un nivel bun de rezerve de umiditate și condiții favorabile pentru desfășurarea lucrărilor sezoniere de câmp

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.09.2022 *Брой:* 9/2022

În prima jumătate a primei decadă a lunii septembrie, condițiile agrometeorologice vor rămâne instabile, cu precipitații frecvente care vor menține rezerve bune de umiditate în straturile superioare ale solului în majoritatea suprafețelor de câmp. Precipitațiile extinse care au căzut în a treia decadă a lunii august, depășind în multe zone ale țării 30-40 l/m² (Lom - 44 l/m², Oriahovo - 54 l/m², Knezha - 53 l/m², Plovdiv - 36 l/m², Kardjali - 72 l/m², Șirpan - 67 l/m², Ahtopol - 60 l/m²), au sporit rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm. Aceste precipitații au venit prea târziu pentru o parte din culturile de primăvară cultivate în condiții de secetă, care, ca urmare a deficitului de umiditate a solului, și-au încheiat vegetația prematur.

ISSN 2815-522X

În prima și majoritatea zilelor celei de-a doua decade a lunii septembrie, dezvoltarea culturilor agricole târzii care au depășit efectele adverse ale secetei estivale va decurge într-un ritm accelerat, la temperaturi în jurul și peste normele climatice. La începutul lunii septembrie, se va finaliza dezvoltarea hibrizilor de porumb semi-târzii. La hibrizii târzii, se va observa stadiul de maturitate lăptoasă, iar la mijlocul lunii – stadiul de maturitate cerată.

La începutul celei de-a doua decade, se prevăd din nou precipitații și se așteaptă un risc crescut pentru dezvoltarea patogenilor care provoacă putrezirea recoltei de fructe și struguri coapte și în curs de coacere - mucegaiul cenușiu la struguri, putregaiul brun târziu la fructele soiurilor toamă-iarnă ale pomilor fructiferi.

Pe parcursul lunii, perioade cu vreme relativ uscată și condiții mai favorabile pentru desfășurarea lucrărilor de câmp sezoniere: recoltarea floarea-soarelui și a hibrizilor mai timpurii de porumb, executarea arăturii adânci și a pregătirii pre-semănat a suprafețelor destinate semănatului cu culturi de toamnă, precum și semănatul rapiței de toamnă, sunt așteptate în a doua jumătate a primei și majoritatea zilelor celei de-a doua decade. Până la sfârșitul celei de-a doua decade a lunii septembrie, se vor aplica termenele optimale agrotehnice pentru semănatul rapiței.

În a treia decadă a lunii septembrie, se prognozează stabilizarea vremii, o scădere substanțială a temperaturilor și schimbările tranzitorii ale condițiilor agrometeorologice tipice pentru sfârșitul verii și începutul toamnei. Precipitațiile așteptate în această perioadă vor asigura umiditatea pentru o încolțire normală a culturilor de rapiță de toamnă semănate în termenele agrotehnice.

În stadiul de încolțire, rapița este afectată de ploșnița călitoare a verzei (adulți) și de musca frunzelor de rapiță (false omizi), ceea ce impune monitorizarea culturilor încolțite pentru prezența acestor dăunători și, atunci când densitatea acestora depășește pragul economic de dăunare (PED pentru ploșnița călitoare a verzei - 2 gândaci pe m²; PED pentru musca frunzelor de rapiță - 2-3 false omizi pe m²), să se efectueze tratamente la timp.

Până la sfârșitul lunii septembrie, nu se prognozează înghețuri în suprafețele de câmp, ceea ce va asigura condiții pentru formarea unei producții suplimentare de la culturile legumicole ale producției târzii de câmp.

Sursa NIMH