


La sfârșitul lunii septembrie și la începutul lunii octombrie, condițiile vor fi favorabile pentru dezvoltarea patogenilor care provoacă putrezirea culturii nerecoltate.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.09.2022 *Брой:* 9/2022



În septembrie, în unele locuri din regiunile sudice (Haskovo, Pazardjik, Șirpan, Karnobat, Plovdiv, Sandanski, Sliven, Burgas), au căzut precipitații semnificative din punct de vedere economic, între 15–20 l/m², care au asigurat umiditatea necesară pentru emergența rapiței de toamnă semănate în termenul agrotehnic.

O îmbunătățire a condițiilor agrometeorologice este prognozată spre sfârșitul lunii. În perioada respectivă, hibridii târzii de porumb își vor finaliza dezvoltarea și vor intra în faza de coacere deplină. La soiurile târzii de

pomi fructiferi și la viță-de-vie, procesele de coacere vor decurge la temperaturi în jurul normelor climatice.

În perioada respectivă, nu se așteaptă precipitații semnificative, iar condițiile vor permite finalizarea recoltării culturilor de primăvară târzii, efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănată pe suprafețele destinate semănatului cu grâu și orz, precum și aplicarea îngrășămintelor minerale. În această perioadă începe termenul agrotehnic pentru semănatul culturilor de cereale de toamnă în câmpiile înalte și în Subcarpați. Până la sfârșitul lui septembrie, condițiile vor permite recuperarea întârzierilor la semănatul rapiței de toamnă. Perioada este favorabilă pentru semănatul de toamnă al spanacului și pentru înființarea de noi plantații de căpșuni.

La începutul perioadei, în locații izolate din câmpiile bazinale, nu poate fi exclusă posibilitatea formării brumei, ceea ce impune recoltarea la timp a produselor sensibile la îngheț.

În prima săptămână a lui octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă, iar în a doua jumătate a perioadei – și de temperaturi sub normale. Precipitațiile prognozate în prima săptămână a lui octombrie vor întârzia eliberarea suprafețelor de culturile târzii pe rânduri. Vremea umedă și rece din mijlocul primei decade va fi o premisă pentru dezvoltarea patogenilor care provoacă putregaiuri – mucegaiul cenușiu pe recolta neculeasă a soiurilor târzii de struguri pentru vin, și putregaiul brun târziu pe fructele soiurilor de pomi fructiferi de toamnă-iarnă.

Precipitațiile căzute la sfârșitul lui septembrie în regiunile nord-vestice, în parte a regiunilor nord-estice și în câmpia Sofia, în intervalul 20–30 l/m² (N. selo, Vidin, Lom, Oriahovo, Sofia, V. Târnovo, Dobrici), au sporit rezervele de umiditate din straturile superioare ale solului. În perioada următoare, în vestul Bulgariei și în regiunile centrale, este din nou prognozată probabilitatea unor precipitații locale, intense, care vor împiedica efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănată pe suprafețele destinate semănatului cu culturi de toamnă. Se așteaptă întârzieri serioase la semănatul rapiței de toamnă. Condițiile agrometeorologice nefavorabile de la sfârșitul verii și începutul toamnei, seceta și precipitațiile intense ulterioare, sunt motivul pentru care în multe locuri din regiunile de câmp s-au depășit termenele agrotehnice din septembrie pentru semănatul rapiței – o cultură care necesită agronomie precisă. La începutul lui octombrie începe termenul agrotehnic pentru semănatul grâului în nordul Bulgariei.

Sursa: INMH