

Prognoză agrometeorologică pentru octombrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2022 Брой: 10/2022



În octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi dinamice, cu temperaturi apropiate de normele climatice și precipitații peste normele lunare.

În primele zile ale lunii octombrie se prognozează temperaturi mai ridicate decât de obicei pentru sezon, ceea ce creează condiții pentru formarea unei producții suplimentare la culturile legumicole târzii, precum și pentru creșterea conținutului de zahăr în fructele soiurilor toamna de pomi fructiferi și ale soiurilor târzii de viță de vie.

După temperaturile peste normă, în a doua jumătate a primei decade se prognozează o răcire de scurtă durată și normalizarea condițiilor termice.

În prima decadă a lunii octombrie se așteaptă precipitații semnificative, care vor îngreuna în continuare desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere. Condiții mai bune pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a solului înainte de semănat și pentru semănatul culturilor de toamnă se așteaptă în prima jumătate a celei de-a doua decade și în majoritatea zilelor celei de-a treia decade.

Seceta și precipitațiile semnificative, în locuri intense, ulterioare de la sfârșitul verii și începutul toamnei au fost motivul pentru nerespectarea termenelor optime de semănat în septembrie pentru rapița de toamnă. O parte semnificativă din suprafețele planificate vor fi semămate în octombrie, după termenele agrotehnice. Din aceste motive obiective, există probabilitatea ca plantele de rapiță semămate târziu să nu reușească să formeze o rozetă (7–8 frunze) în timpul vegetației de toamnă – faza în care plantele iernează cu succes.

Octombrie este perioada optimă pentru semănatul cerealelor de toamnă. În prima decadă este termenul agrotehnic pentru semănatul grâului în nordul Bulgariei, din 15 până în 25 octombrie – în sudul Bulgariei, iar la sfârșitul lunii – în zonele de lângă coasta Mării Negre.

Pe parcursul lunii, etapele inițiale de vegetație ale culturilor de toamnă semămate vor decurge în ritm moderat, având în vedere prezența unor rezerve bune de umiditate în straturile superioare ale solului. La sfârșitul lunii octombrie, la grâu, în funcție de termenele de semănat, se vor observa stadiile de încolțire și al treilea frunză. În plantele semămate cel mai devreme, la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, se va observa și începutul stadiului de încărcare. La rapiță va predomina formarea frunzelor.

Condițiile termice prognozate în octombrie, apropiate de normă, sunt o premisă pentru creșterea populației de șoarece de câmp – unul dintre dăunătorii periculoși ai culturilor de toamnă. Până la sfârșitul lunii, plantele de toamnă trebuie inspectate pentru prezența dăunătorului, iar dacă densitatea acestuia depășește pragul economic de dăunare (2 colonii active pe decar), sunt necesare măsuri de protecție a plantelor în timp util (mome otrăvitoare plasate la intrările coloniilor).

La sfârșitul lunii octombrie, condițiile vor permite implementarea anumitor activități fitosanitare în livezi. Livezile de măr și păr afectate de pară, după recoltare, trebuie tratate cu o soluție de uree de 5% pentru a reduce infecția. La speciile cu sâmbure, după căderea masivă a frunzelor, se recomandă pulverizarea cu amestec bordelez 2% împotriva agenților cauzatori ai găurilor de glonț, putregaiului brun timpuriu și buclei frunzelor de piersic.

