

A treia decadă a lunii octombrie – un factor limitativ pentru dezvoltarea culturilor de toamnă va fi lipsa de umiditate din straturile superioare ale solului.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2022 Брой: 10/2022



În prima jumătate a ultimei decadă a lunii octombrie, condițiile agrometeorologice vor continua să fie determinate de vreme uscată și temperaturi peste normele climatice.

În culturile de grâu și orz semănate la începutul lunii, vor avea loc fazele de germinare, încolțire (stațiile agrometeorologice Novacene și Pavlikeni) și începutul formării frunzelor, iar la rapița de toamnă – formarea frunzelor. În multe regiuni ale țării, factorul limitativ pentru dezvoltarea culturilor de toamnă va fi lipsa umidității

din straturile superioare ale solului. În a doua jumătate a perioadei, vor începe termenele agrotehnice optime pentru semănatul culturilor de cereale de toamnă de-a lungul litoralului Mării Negre.

Deficitul de rezerve de umiditate a solului din stratul arabil va împiedica executarea corespunzătoare a arăturii adânci a ogorurilor cu resturi vegetale, a pregătirii pre-semănat a solului și a semănatului grâului și orzului.

Vremea va fi favorabilă pentru inspectarea culturilor de cereale de toamnă în vederea apariției și activității dăunătoare a unor dăunători – șoarecele de câmp comun, gândacul frunzelor de cereale, muștele cerealelor și afidele. O atenție deosebită trebuie acordată zonelor unde se aplică cultivarea în monocultură.

Condițiile vor fi favorabile pentru efectuarea activităților fitosanitare în culturi permanente – îndepărtarea ramurilor uscate și a fructelor mumificate, zgârirea scoarței vechi și crăpate, și tratarea speciilor de pomonece afectate de pojar cu o soluție de uree de 5% pentru a limita infecția.

Sursa: INMH