

Proгноza agrometeorologică pentru noiembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.11.2022 Брой: 11/2022



În prima jumătate a lunii noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme uscată și temperaturi peste normele climatice. Până la mijlocul lunii, factorul limitativ pentru dezvoltarea culturilor de toamnă semănate va continua să fie deficitul de umiditate a solului. În unele părți ale regiunilor sudice și sud-estice (stația agrometeorologică Karnobat), seceta rezultată va pune la îndoială supraviețuirea unei părți din culturile germinate și încolțite.

La sfârșitul lunii octombrie, nivelul rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 și 100 cm a fost neobișnuit de scăzut, în multe locuri din sudul Bulgariei – sub 40% din capacitatea de câmp (stațiile agrometeorologice: Plovdiv, Pazardzhik, Sliven). În unele părți ale regiunilor sud-estice (stația agrometeorologică Karnobat) nu a existat umiditate în întregul strat de sol de un metru.

La începutul lunii noiembrie, seceta va limita realizarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului și, în unele dintre suprafețele de câmp, va întârzia semănarea culturilor de cereale de toamnă dincolo de termenele agrotehnice.

În a doua jumătate a lunii noiembrie, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare. Din mijlocul celei de-a doua până la mijlocul celei de-a treia decadă, sunt prevăzute precipitații, precum și o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului în straturile superioare și a condițiilor pentru progresul stadiilor inițiale de vegetație ale culturilor de toamnă semănate. În această perioadă, dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă va avea loc la temperaturi medii zilnice apropiate de normele climatice pentru a doua jumătate a lunii.

La sfârșitul lunii noiembrie, grâul și orzul se vor afla în fazele de încolțire și formare a primei, a doua și a treia frunze. Pentru o mică parte a culturilor în anumite locuri din regiunile Câmpiei Dunării (stațiile agrometeorologice: Bazovets, Novachene, în regiunea Ruse), unde precipitațiile locale de la începutul toamnei au asigurat umiditate pentru vegetația inițială a culturilor de cereale de toamnă, se va observa și faza de încălțare.

Nu sunt prevăzute temperaturi minime critice pentru culturile de toamnă încolțite în cursul lunii. La începutul lunii noiembrie, trebuie continuat controlul culturilor pentru prezența dăunătorilor – mineriul frunzelor de grâu, muștele cerealelor – și acolo unde densitatea acestora depășește pragul economic de dăunățenie (pentru muștele cerealelor PED este 3–4 buc/m², pentru mineriul frunzelor de grâu – peste 3 larve/m²), trebuie efectuat un tratament oportun.

Condiții favorabile pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor de toamnă în livezi, pentru limitarea infecțiilor de tăciune, putregaiul brun timpuriu, găurirea frunzelor, bula piersicului și alți patogeni care iernează, vor apărea în prima jumătate a lunii noiembrie, iar pentru plantarea pomilor fructiferi – în a treia decadă.

Sursa: NIMH