

Proгноza agrometeorologică pentru luna martie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 14.03.2023 Брой: 3/2023



Anomaliile climatice din a doua jumătate a lunii februarie, cu temperaturi maxime neobișnuit de ridicate pentru sezon, depășind 21-22°C în multe dintre zonele de câmpie (Knezha - 24°C, Lovech - 23°C, Pleven - 23°C, Plovdiv - 23°C, Chirpan - 23°C), au condus la activarea proceselor vegetației în culturile semănate toamna și la dezvoltarea prematură a pomilor fructiferi.

În primele zece zile ale lunii martie, doar în unele locuri din sudul Bulgariei – Plovdiv, Pazardzhik, Sandanski, Kardzhali și Haskovo, s-au înregistrat precipitații semnificative din punct de vedere economic, între 20-30 l/m2, ceea ce a dus la o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului în culturile semănate toamna.

În regiunile centrale și de est, temperaturile au fost peste normele climatice și peste minimul biologic necesar pentru vegetația culturilor de cereale de toamnă.

În majoritatea zilelor celei de-a doua perioade de zece zile, în regiunile de câmpie ale țării, se prognozează temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru perioadă, precum și condiții pentru o vegetație întârziată la culturile de cereale de toamnă.

Se așteaptă o creștere a temperaturilor și o activare a proceselor vegetației în culturile semănate toamna și în plantațiile perene în prima jumătate a celei de-a treia perioade de zece zile. La sfârșitul lunii martie, stadiul de încovoietoare va predomina la grâu și orz.

Pe parcursul lunii, culturile pomicole vor trece prin diverse stadii - de la umflarea și deschiderea mugurilor fructiferi până la stadiul de buchet verde, înflorire și legare a fructelor la speciile cu înflorire timpurie de sămbure (migdal, cais, piersic).

În martie, se prognozează temperaturi minime în intervalul minus 5-10°C - valori critice pentru florile și legăturile tinere de fructe ale pomilor fructiferi.

Precipitațiile așteptate pe parcursul lunii, în jurul și peste normă, vor crește rezervele de umiditate a solului în stratul de 100 cm. Ca urmare a precipitațiilor sub normale din februarie, nivelul rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 și 100 cm la culturile de cereale de toamnă din regiunile extreme sudice și sud-estice a fost neobișnuit de scăzut pentru sezon - în unele locuri sub 55% din capacitatea de câmp (stațiile agrometeorologice Sliven, Chirpan).

În martie, vremea dinamică prognozată, cu precipitații frecvente, va împiedica implementarea activităților agrotehnice sezoniere. Condiții mai favorabile pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor înainte de înflorire la pomii fructiferi vor apărea în a doua jumătate a primei perioade de zece zile. Pe parcursul lunii, conținutul crescut de umiditate din straturile superioare ale solului va limita efectuarea lucrărilor de pregătire a solului înainte de semănat pe suprafețele destinate semănatului cu culturi de primăvară timpurii și medii-timpurii. Din acest motiv, există probabilitatea de a rata termenele optime de semănat pentru floarea-soarelui în regiunile sudice.

La mijlocul lunii martie începe perioada agrotehnică (15-20.03) pentru semănatul florii-soarelui în sudul Bulgariei, iar la mijlocul celei de-a treia perioade de zece zile (25.03–5.04) – în Câmpia Dunării.

Unde și când în diferitele regiuni ale țării vor exista condiții pentru efectuarea activităților de protecție a plantelor, vedeți [AICI](#)

Sursa NIMH