

'Унивок® – protecție extraterestră împotriva bolilor cerealelor'

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 24.03.2023 Брой: 3/2023



„Извънземна“ защита от болести

Fungicid de la **Corteva Agriscience™** cu o nouă substanță activă **Inatreq™ active**, un nou mod de acțiune și o nouă **formulare iQ-4**

UNIVOC® este un nou fungicid care oferă o acțiune excepțională preventivă, de stopare și curativă împotriva tuturor bolilor de importanță economică din culturile de cereale. Este un fungicid bicomponent, dublu sistemic, care conține prothioconazol, unul dintre cele mai noi triazoale, cu acțiune sistemică, eradicantă și preventivă îndreptată împotriva bolilor cerealelor, inclusiv a speciilor de rugină, a petelor foliare și a fusariozei, și complet noua substanță activă **Inatreq™ active** dintr-o nouă grupă chimică și cu un nou mod de acțiune împotriva unui larg spectru de boli, al cărui cel mai semnificativ avantaj este că reprezintă noul standard de referință împotriva

speciilor de Septoria și un instrument pentru managementul rezistenței la acest patogen. Ingredientele active din **UNIVOC®** se completează reciproc într-un așa-numit efect sinergic, oferind agricultorilor un instrument nou pentru controlul tuturor bolilor din culturile de cereale.

Унивок®
Inatreq^{active}
ФУНГИЦИД

НОВ!

Начин на действие

Инихибира митохондри-алното дишане

Произведеното количество на аденозин трифосфат (АТР) е намалено и защото АТР е основния енергиен носител, който задвижва жизнените функции на клетките, ключови биопроцеси се нарушават, растежът се възпрепятства и губите умират.

Inatreq™ active este o moleculă creată din actinomicetul *Streptomyces* și prin fermentație ulterioară. Acest fapt demonstrează efectul favorabil al produsului asupra mediului și asupra culturilor.

UNIVOC® asigură o durată excelentă de protecție, suficientă pentru a proteja culturile chiar și sub cea mai mare presiune de infecție, combinată cu un efect fiziologic exprimat prin stimularea fotosintezei, blocarea hormonului etilenă format în cultură în condiții de stres, stimularea formării rădăcinilor și, pe această bază, ajutând cultura să-și realizeze potențialul maxim de producție și să obțină parametri de calitate înaltă a boabelor.

Отличен в класа си

Septoria tritici
Септория по листата

Dredhslera / Helminthosporium
Мрежести петна

Puccinia striiformis
Жълта ръжда

Erysiphe graminis
Брашнеста мана

Puccinia recondita
Кафява ръжда

Pseudocercospora
Базично пилиене

Fusarium spp.
Фузариум по класа

Rhynchosporium secalis
Листен пригор

Унивок®
Inatreq active
ФУНГИЦИД

НОВ!

Potrivit agricultorilor care au folosit **UNIVOC®** în 2022, fungicidul asigură un control excelent al mănării, al petei gălbui-brună a frunzelor, al fusariozei, al patului ochiului de pasăre, al ruginii brune, al ruginii galbene, al mucegaiului zăpezii, al arsurii timpurii a frunzelor și al septoriozei. **UNIVOC®** se aplică într-o doză flexibilă în funcție de momentul aplicării, după cum urmează: T1 – 120 ml/ha; T2 – 130 ml/ha și T3 pentru protecția împotriva fusariozei la o doză de 130 până la 150 ml/ha.

Datorită noului său mod de acțiune, **UNIVOC®** nu prezintă rezistență încrucișată cu alte fungicide, ceea ce îl face o nouă armă anti-rezistență pentru controlul bolilor de primăvară din culturile de cereale.

UNIVOC® se află într-o formulare specială bazată pe tehnologia iQ-4 pentru o adeziune și penetrare mai bună în părțile plantei și pentru o protecție mai durabilă împotriva patogenilor.

Tehnologia iQ-4 este o formulare nou patentată care conține un sistem de adjuvanți special conceput.

Унивок®
Inatreq[®] active
ФУНГИЦИД

Продължителна и сигурна защита



До 6 седмици след третиране в
зависимост от условията



Нетретирана контрола



Унивок®

Авантажеle includ:

- Întindere și acoperire îmbunătățite pe suprafața frunzei chiar și la volume mici de apă
- Penetrație și redistribuire îmbunătățite în țesuturile plantei
- Asigură o acoperire de 97,5% a părților plantei
- Opt zile după tratament, 90% din produs este încă prezent pe părțile plantei
- Activitate prelungită și fiabilă pentru până la 6 săptămâni după tratament, în funcție de condițiile meteorologice