

În a treia decadă a lunii aprilie, condițiile vor fi favorabile pentru creșterea fondului infecțios al unei serii de boli fungice.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.04.2023 Брой: 4/2023



În perioada următoare de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme variabilă cu precipitații frecvente, care vor menține un nivel foarte bun al rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 cm și condiții bune pentru vegetația culturilor însămânțate toamna și a celor nou însămânțate primăvara.

Precipitațiile semnificative căzute în primele două decenii ale lunii aprilie în majoritatea zonelor țării au depășit normele lunare (Vidin - 61 l/m², Vrața - 84 l/m², Veliko Tărnovo - 74 l/m², Razgrad - 103 l/m², Silistra - 77 l/m², Șumen - 86 l/m², Dobrici - 80 l/m², Haskovo - 77 l/m², Kardjali - 60 l/m², Elhovo - 91 l/m², Stara Zagora - 77 l/m², Karnobat - 68 l/m²) și au îmbunătățit rezervele de umiditate și în straturile mai adânci ale solului. La sfârșitul

celui de-al doilea deceniu, în majoritatea suprafețelor de câmp, rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm pentru culturile cerealiere de toamnă au atins niveluri peste 80–85% din capacitatea de câmp.

În majoritatea zilelor perioadei viitoare, dezvoltarea culturilor agricole va progresa într-un ritm moderat, la temperaturi apropiate de normele climatice, iar spre sfârșitul perioadei, ușor sub acestea. În cursul perioadei, grâul se va afla predominant în faza de înălțare a tulpinii, iar la orz, în unele locuri din Câmpia Dunării (stația agrometeorologică Novacene), se va observa și începutul înspicării. Rapita de toamnă va fi predominant în faza de înflorire. În culturile de floarea-soarelui și porumb, în funcție de datele de însămânțare, se va observa răsărirea și formarea frunzelor.

În Bulgaria de Nord Centrală și de Nord-Vest, din nou din cauza ploilor îndelungate și a condițiilor climatice nefavorabile, însămânțarea este amânată. Producătorii au asigurat semințele necesare, suprafețele au fost pregătite și, în condiții favorabile, agricultorii sunt pregătiți să semene la prima oportunitate. Suprafețele însămânțate până acum sunt foarte mici în comparație cu aceeași perioadă din anii precedenți.

Precipitațiile frecvente prevăzute în al treilea deceniu al lunii aprilie vor crea condiții pentru creșterea presiunii de infecție de la o serie de boli fungice: septorioza și rugină frunzară la cerealele de toamnă; la pomii fructiferi – arsura florilor (monilioza timpurie), găurirea frunzelor, bula de piersic, tăbăcirea, ceea ce impune, la prima oportunitate după încetarea precipitațiilor, aplicarea la timp a măsurilor de protecție a plantelor.

Sursa: INMH