

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.05.2023 Брой: 5/2023



În perioada următoare, condițiile agrometeorologice vor fi din nou determinate de vreme instabilă, cu precipitații frecvente, care vor menține rezerve bune de umiditate în stratul de sol de 50 și 100 cm.

În majoritatea părților țării, cu excepția unor localități din regiunile estice (Cearpăn, D. Ciflic, Carnobat), rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru pentru culturile semănate toamna sunt peste 80% din capacitatea de câmp (CC).

Pe parcursul perioadei, dezvoltarea culturilor agricole va progresa într-un ritm moderat, la temperaturi zilnice medii apropiate de normele climatice pentru a doua jumătate a lunii mai. Până la mijlocul celei de-a treia decadă, în suprafețele de câmp, culturile de cereale de toamnă vor fi în faza de formare și umplere a bobului. La sfârșitul perioadei, la orz, în unele localități din regiunile sudice (Sandianski, Carnobat) se va observa și debutul fazei de coacere lăptoasă.

La floarea-soarelui și porumb, va fi în curs formarea frunzelor.

La vița de vie, va predomina faza de înflorire. Această fenofază este critică pentru infectarea viței-de-vie cu mană (*Plasmopara viticola*) și făinarea (*Uncinula necator*).

Precipitațiile prognozate în perioadă vor menține condiții favorabile pentru dezvoltarea bolilor fungice: ruginile, septorioza și fusarioza spicelor la grâu; manele la culturile legumicole și la vița de vie; putregaiul brun târziu la fructele soiurilor timpurii de cireș.

La sfârșitul lunii mai, daunele la soiurile de cireș semi-timpurii sunt cauzate de musca fructelor de cireș. Pentru a reduce daunele de la acest dăunător periculos, se recomandă ca la începutul fazei de coacere, la prima oportunitate după încetarea precipitațiilor, să se efectueze tratamente cu insecticide cu interval scurt pre-recoltare.

Sursa: INMH