

Creșterea probabilității de furtuni cu grindină și a presiunii infecțioase ridicate din partea patogenilor fungici în culturile agricole în luna iunie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.06.2023 *Брой:* 6/2023



În prima decadă a lunii iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme instabilă și răcoroasă pentru sezon. Precipitațiile prognozate pe parcursul decadei vor menține un nivel ridicat al rezervelor de umiditate a solului în straturile de 50 cm și 100 cm – în majoritatea suprafețelor de câmp peste 80–85% din capacitatea de câmp (CC). Prezența unor rezerve foarte bune de umiditate a solului la începutul lunii iunie va avea un efect benefic asupra culturilor de cereale de toamnă, în care umplerea boabelor, formarea bobului și stadiul de coacere lăptoasă vor avea loc în culturile din regiunile sudice și sud-estice ale țării. În perioada

interfață umplerea boabelor – coacere lăptoasă, pagubele la grâu sunt cauzate de larvele de ploșniță-soarelui, ceea ce necesită inspectarea culturilor în câmp și, atunci când densitatea dăunătorului depășește pragul economic de dăunare (2 larve/mp), tratamentul oportun.

După vremea răcoroasă de la începutul celei de-a doua decade, este prognozată o creștere a temperaturilor și o accelerare a ritmurilor de dezvoltare ale culturilor agricole. Până la mijlocul lunii iunie, în majoritatea suprafețelor de câmp, orzul va atinge stadiul de coacere ceară.

În majoritatea zilelor din a doua jumătate a lunii iunie, dezvoltarea culturilor agricole va avea loc la temperaturi apropiate de normele climatice. La începutul celei de-a treia decade, grâul va fi predominant în stadiul de coacere.

Până la sfârșitul lunii, o parte din culturile de primăvară vor intra în stadiile de dezvoltare reproductivă: la floarea-soarelui se va observa începutul înfloririi, iar la hibridii timpurii de porumb – înțeparea și înflorirea panicului.

Condițiile meteorologice din iunie vor menține un fond infecțios ridicat al patogenilor fungici: mană la culturile legumicole, putregaiul brun târziu la soiurile târzii de cireș, poala și făinarea la pomii fructiferi. La vița de vie, perioada interfață de la înflorirea inflorescențelor până la formarea boabelor de mărimea unui bob de mazăre este critică pentru infecția cu mană.

Pe parcursul lunii, condiții mai favorabile pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor vor apărea în prima jumătate a celei de-a doua și în majoritatea zilelor celei de-a treia decade.

În iunie, probabilitatea furtunilor cu grindină va rămâne ridicată. După o furtună cu grindină, culturile de fructe și legume afectate ar trebui tratate la prima ocazie (de preferință în termen de 48 de ore după eveniment) cu fungicide pe bază de cupru.