

În livadă în iulie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



În luna iulie, în **livezile de măr** unde nu a apărut infecția de tăciune, stropirea împotriva acestei boli este întreruptă. În prezența infecției pe frunze și fructe și cu ploii frecvente, riscul infecțiilor tardive și al creșterii gradului de afectare a fructelor persistă, ceea ce în acest caz necesită tratamente chiar și în această perioadă.

Pentru soiurile de măr sensibile la făinarea mărului, stropirea împotriva acestei boli continuă de asemenea. Pentru combaterea simultană a ambelor boli, se utilizează unul dintre următoarele fungicide: Bellis – 80 g/da, Sulgran – 750 g/da și Kumulus – 600–900 g/da împotriva făinării, și Chorus 50 WG – 0,03%, Difcor 250 EC – 15 ml/da, Koprations Duo – 300 g/da, Scab – 300 ml/da și Captan 80 WG – 150–180 g/da împotriva tăciunelui. Pentru combaterea simultană a ambelor boli, sunt potrivite: Flint Max 75 WG – 0,02%, Score 250 EC – 0,02%, Luna Experience – 20–75 ml/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Revyona – 200 ml/da.

Pentru a preveni apariția rezistenței ciupercii care provoacă tăciunea (*Venturia inaequalis*), este cel mai bine să se alterneze produse cu moduri de acțiune diferite asupra patogenului sau să se utilizeze amestecuri de fungicide pentru combaterea sa.

Soiurile rezistente la tăciune – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola, etc., sunt stropite doar împotriva făinării.

Pentru **păr**, stropirea împotriva tăciunelui și a petelor albe și brune de pe frunze trebuie continuată. Pentru combaterea acestor boli, se utilizează unul dintre următoarele fungicide: Difcor 250 EC – 15 ml/da, Luna Experience – 20–75 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da.

Pentru **prun** în iulie, stropirea este îndreptată împotriva putregaiului brun și a ruginii. Împotriva putregaiului brun, stropirea se efectuează cu unul dintre următoarele fungicide: Difcor 250 EC – 20 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Chorus 50 WG – 0,045%, Geoxe – 40–60 g/da. Împotriva ruginii, este aprobat Signum WG – 45 g/da, care este eficient și împotriva putregaiului brun.

La începutul lunii iulie, fructele soiurilor timpurii de piersic încep să se coacă și în această perioadă acestea nu sunt stropite. Pentru **soiurile târzii de piersic**, continuă combaterea făinării, găuririi și a putregaiului brun. Împotriva făinării, se utilizează unul dintre următoarele fungicide: Score 250 EC – 0,02%, Luna Experience – 50 ml/da, Topaz 100 EC – 0,03%, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da. Pentru combaterea putregaiului brun, stropirea se efectuează cu Delan 700 WDG – 0,05%, Chorus 50 WG – 0,045% sau Luna Experience – 63–75 ml/da.



În iulie, caisele se coc și acestea nu sunt stropite.

Pentru **zmeur**, în această perioadă nu se efectuează stropiri, cu excepția **soiurilor remontante** precum Lyulin. Pentru acestea, sunt necesare tratamente împotriva didimelei și antracnozei. Se utilizează unul dintre următoarele fungicide: Signum WG – 100 g/da și Funguran OH 50 WP – 0,15%. Cu ploii frecvente și umiditate ridicată a aerului, este necesară și stropirea împotriva putregaiului cenușiu. Se utilizează Switch 62.5 – 100 g/da.

După recoltare, frunzele **plantațiilor de căpșuni** sunt tăiate, îndepărtate din plantație și distruse prin ardere sau îngropate pentru a se descompune.