

La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august – dezvoltarea culturilor agricole va avea loc la temperaturi apropiate de normele climatice și în condiții de deficit de umiditate a solului.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.07.2023 Брой: 7/2023*



Vremea caldă din majoritatea zilelor celei de-a treia decade a lunii iulie, cu temperaturi maxime extrem de ridicate până la și peste 40-42°C, a perturbat cursul normal al proceselor de vegetație la culturile agricole. Aceste valori au provocat stres termic și arsuri foliare la o parte din culturile de primăvară tardive, precum și căderea prematură a frunzelor la pomii fructiferi. (La stația agrometeorologică din Silistra se observă îngălbenirea prematură a frunzelor la 50% din suprafețele cultivate cu porumb în condiții neirigate).

După răcirea scurtă, dar semnificativă de la sfârșitul perioadei de șapte zile trecute, în ultimele zile ale lunii iulie și la începutul lunii august, dezvoltarea culturilor agricole va avea loc la temperaturi apropiate de normele climatice și în condiții de deficit de umiditate a solului. Precipitațiile de la sfârșitul lunii iulie au avut un caracter local și, în majoritatea zonelor țării, cu excepția unor localități din regiunile nord-vestice (N. Selo, Lom, Knezha, Pleven) și sud-estice (Sliven, Karnobat, Burgas), au fost nesemnificative, sub 10 l/m². În perioada următoare, nu sunt prevăzute precipitații cu semnificație agronomică, iar aplicarea unui regim de irigație adecvat rămâne o măsură prioritară pentru culturile agricole tardive. La începutul lunii august, hibrizii de porumb timpurii vor intra în faza de coacere a boabelor, la hibrizii mediu-timpurii se va observa faza lăptoasă, iar la hibrizii de porumb mai târzii va avea loc formarea și umplerea boabelor. La floarea-soarelui, în unele zone din Câmpia Dunării și în regiunile sudice, va progresa faza de coacere.

La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, tratamentele de protecție a plantelor trebuie efectuate în orele mai răcoroase, folosind produse cu un interval de așteptare adecvat înainte de recoltare, în concordanță cu perioada de coacere a culturilor. În livezile fructifere, combaterea celei de-a doua generații de molii ale fructelor nu trebuie subestimată. Culturile legumicole afectate de grindina care a căzut la sfârșitul perioadei trecute sunt recomandate a fi tratate cu fungicide pe bază de cupru.

Sursa: INMH