

# Septembrie – condiții favorabile pentru formarea unui randament suplimentar la culturile legumicole târzii

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.09.2023 Брой: 9/2023



În majoritatea zilelor primei decadă a lunii septembrie, sunt prevăzute condiții termice peste normal, ceea ce va accelera etapele finale de dezvoltare ale culturilor agricole târzii. În această perioadă, hibrizii de porumb mijlociu-târziu vor fi în fazele de ceară și de coacere completă, în timp ce hibrizii târzii vor fi în faza de coacere lăptoasă și de trecere la coacerea în ceară.

La începutul celei de-a doua decade, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare. Până la mijlocul celei de-a treia decade, acestea vor fi determinate de vreme instabilă și temperaturi apropiate de normele climatice.

În această perioadă, sunt prevăzute precipitații de importanță economică, care, după seceta accentuată, vor îmbunătăți condițiile pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare de semănat ale suprafețelor destinate semănăturilor de toamnă. Până la sfârșitul celei de-a doua decade a lunii septembrie este termenul agrotehnic optim pentru semănatul rapiței de toamnă.

În cursul celei de-a doua decade, și hibridii târzii de porumb își vor finaliza dezvoltarea, iar orezul va fi în fazele de ceară și de coacere completă. Precipitațiile frecvente prevăzute în a doua și în prima jumătate a celei de-a treia decade vor crește riscul de dezvoltare a patogenilor care provoacă putrezirea producției de fructe și legume în curs de coacere – mucegaiul cenușiu la struguri (*Botrytis cinerea*), putregaiul brun târziu (*Monilinia fructigena*) la fructele soiurilor de toamnă-iarnă ale pomilor fructiferi, mana porumbului (*Phytophthora infestans*) la roșiile din producția târzie, etc.

În a doua jumătate a celei de-a treia decade, se așteaptă vreme uscată și condiții favorabile pentru recoltarea strugurilor. Ca urmare a temperaturilor estivale peste normal, o parte dintre soiurile mai târzii de struguri pentru vin vor atinge maturitatea tehnologică mai devreme decât termenele obișnuite.

La sfârșitul lunii septembrie, este recomandabil ca livezile de peri să fie inspectate pentru prezența unui dăunător periculos – gândacul mugurilor de păr. Combaterea acestui dăunător este eficientă doar împotriva adulților la începutul toamnei. Dacă densitatea dăunătorului depășește pragul de dăunare economică (3 gândaci pe pom), este necesar un tratament.

În septembrie, nu sunt prevăzute temperaturi minime critice, iar condițiile vor permite formarea de producție suplimentară la culturile legumicole târzii sensibile la îngheț.

*Sursa: INMH*