

Dăunătorii din livadă în septembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.09.2023 Брой: 9/2023



În septembrie, temperaturile medii zilnice scad, iar în a doua jumătate a lunii pot apărea înghețuri timpurii, furtuni și grindină, care provoacă pagube serioase plantelor și producției de fructe. Perioada se caracterizează printr-o tranziție graduală de la condițiile de vară la cele de toamnă-iarnă. Aparatul foliar al pomilor fotosintetizează foarte activ, furnizând asimilați pentru nutriția fructelor, diferențierea mugurilor fructiferi și acumularea de nutrienți de rezervă. Pentru a asigura o acumulare mai bună a nutrienților, o toleranță mai ușoară a temperaturilor scăzute de iarnă și o rodire normală în anul următor, este necesară recoltarea fructelor în timp util.

Dezvoltarea bolilor la culturile pomicele scade în această perioadă, dar în condiții ploioase pot apărea infecții de tăciune la măr, chiar și în timpul recoltării soiurilor de toamnă și de iarnă. Densitatea dăunătorilor scade

semnificativ, deoarece mulți dintre aceștia au intrat în stadii inactive – pupă și ouă, dar ultimele omizi eclozate din ultimele generații de viermele mărului continuă să provoace viermănarea fructelor.



Păianjenul roșu al pomilor fructiferi

În septembrie, activitatea dăunătoare a speciei continuă. Larvele, nimfele și adulții sug seva din frunze, drept urmare conținutul de clorofilă scade, iar acest lucru afectează negativ fotosinteza. În cazul unei infestări severe, frunzele se usucă prematur și cad.

Combatere: Pentru a reduce populația de ouă care va ierna, trebuie efectuată o tratare la un prag economic de daună de 3–4 forme mobile pe frunză.

Produse fitosanitare autorizate: s.a. hexythiazox 31,2 g/l + fenpyroximate 62,4 g/l – Nissorun Plus 120 ml/da; s.a. acequinocyl 164 g/l – Kanemite SC 120–180 ml/da; s.a. Beauveria bassiana, tulpina ATCC 74040 0,185 g/l – Naturalis – 100–150 ml/da; s.a. ulei de parafină 800 g/l – Ovipron Top EC – 1000–2000 ml/da; s.a. tebufenpyrad 200 g/kg – Shirudo – 25 g/da.



Psila pârului

În septembrie, se încheie dezvoltarea celei de-a patra generații și începe dezvoltarea celei de-a cincea generații. Adulții și larvele sug seva și excretă abundant mană, ceea ce duce la formarea ciupercilor fumagine. În cazul unei infestări severe, întregi pomi pot muri.

Combatere: Înainte de migrarea în masă către locurile de iernare și pentru a reduce populația de psila care va ierna, trebuie efectuată o tratare la un prag economic de daună de 4–6% lăstari cu colonii de adulți și larve pe pom.

Produse fitosanitare autorizate: s.a. tebufenpyrad – Shirudo 25 g/da; s.a. spirotetramat – Movento 100 SC 0,12–0,15%; s.a. Beauveria bassiana, tulpina ATCC 74040 0,185 g/l – Naturalis – 100–150 ml/da; s.a. deltamethrin 100 g/l – Decis 100 EC – 100–150 ml/da.



Gărgărița mugurilor de păr

Un dăunător grav al părului, care dezvoltă o generație pe an și iernează sub formă de ou în muguri. Larvele eclozează primăvara, adulții apar în mai și intră în diapauză până la sfârșitul lui septembrie. Când reapăr mai târziu, își depun ouăle în muguri, unde acestea rămân să ierneze.

Combatere: Măsurile de combatere sunt direcționate împotriva adulților, înainte de depunerea ouălor, la depistarea primelor perechi copulatoare toamna.

Produse fitosanitare autorizate: Nu există produse oficial omologate; pot fi utilizate toate insecticidele de contact la concentrațiile aplicate împotriva altor dăunători.

** Articolul a fost actualizat la 15.09.2025.*