

Octombrie – condiții optime pentru semănatul culturilor de cereale de toamnă și producție suplimentară din culturile legumicole și soiurile târzii de pomi fructiferi și viță de vie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.10.2023 Брой: 10/2023



În octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și peste normele climatologice și precipitații în jurul și sub normele lunare.

La începutul lunii octombrie, temperaturile prognozate peste normal, cu valori maxime de până la 30-32°C, vor accelera procesele de coacere la soiurile târzii de pomi fructiferi și viță de vie și vor crea condiții pentru recoltarea unei producții suplimentare de la culturile legumicole de producție târzie de câmp (roșii, ardei,

dovlecei, castraveți). Ca urmare a condițiilor termice peste normal, soiurile târzii de struguri pentru vin roșu vor atinge maturitatea tehnologică mai devreme decât datele obișnuite, iar soiurile de fructe de toamnă vor atinge maturitatea de cules.

După vremea relativ uscată și caldă pentru sezon din a doua jumătate a primei decade, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare. În această perioadă se prognozează o scădere substanțială a temperaturilor minime, cu condiții pentru formarea brumei în depresiuni și pe câmpiile mai înalte, ceea ce va impune recoltarea în timp util a culturilor legumicole sensibile la brumă (roșii, ardei).

La sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decade se așteaptă precipitații de importanță economică, o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului din straturile superioare ale solului și a condițiilor pentru efectuarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului. Seceta de la sfârșitul verii și începutul toamnei în multe părți ale țării, cu excepția regiunilor din sud-est, a întârziat lucrările de pregătire pre-semănat a suprafețelor destinate semănatului cu culturi de toamnă. Din acest motiv, într-o mare parte a regiunilor de câmp, termenele agrotehnice din septembrie pentru semănatul rapiței de toamnă nu au fost respectate.



Octombrie este perioada optimă pentru semănatul culturilor de cereale de toamnă. În prima decadă este termenul agrotehnic pentru semănatul grâului în Bulgaria de Nord, între 15 și 25 octombrie în Bulgaria de Sud, iar la sfârșitul lunii – de-a lungul litoralului Mării Negre.

În majoritatea zilelor din a doua jumătate a lunii octombrie, stadiile inițiale de vegetație ale culturilor de toamnă semănate vor decurge în condiții termice peste normal. La mijlocul și sfârșitul celei de-a treia decade există o probabilitate prognozată de precipitații, o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 cm de sol și a condițiilor pentru dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă. La sfârșitul lunii octombrie, la grâu, în funcție de datele de semănat, se vor observa următoarele stadii: încolțire și formarea frunzelor (1-3 frunze).

Condițiile termice prognozate în octombrie, în jurul și peste normă, sunt o premisă pentru creșterea populației de șoarece de câmp – unul dintre dăunătorii periculoși din culturile de toamnă. La sfârșitul lunii, culturile de toamnă trebuie inspectate pentru prezența dăunătorului, iar acolo unde densitatea acestuia depășește pragul economic de dăunare (2 colonii active pe decar), sunt necesare măsuri de protecție a plantelor în timp util (momele otrăvite plasate la intrările coloniilor).

În livezile de mere și pere, la începutul căderii frunzelor, după recoltarea fructelor, se recomandă pulverizarea pomilor cu o soluție de uree de 5%. Acest tratament limitează infecția cu tăciune.

Pentru speciile cu sâmbure, împotriva cancerului bacterian, bășicii frunzelor de piersic, găuririi frunzelor și putregaiului brun timpuriu la cais, cireș și vișin, după căderea în masă a frunzelor, trebuie efectuată o pulverizare cu amestec Bordeaux 2%.

Sursa: INMH