

În a doua jumătate a lunii octombrie, se așteaptă o îmbunătățire a stării hidrofizice a stratului superior de sol.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 16.10.2023 Брой: 10/2023



Absența precipitațiilor în prima și la începutul celei de-a doua decade din octombrie a dus la adâncirea secetei în curs. În majoritatea regiunilor arabile ale țării, nu există umezeală productivă în stratul de sol de 50 cm, iar în unele zone din sud-vestul Bulgariei (stația agrometeorologică Kyustendil) – în întregul strat de un metru.

După vremea prognozată, uscată și sezonier caldă până la mijlocul lunii octombrie, în a doua jumătate a celei de-a doua decade, condițiile agrometeorologice se vor schimba. În această perioadă se așteaptă precipitații extinse, în unele locuri până la $15-20 \text{ l/m}^2$, o îmbunătățire a stării hidrofizice a stratului superior de sol și a

condițiilor pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a solului, întârziate, în vederea semănatului, pe suprafețele destinate culturilor de toamnă. Din cauza secetei, în multe locuri din regiunile arabile, termenele agrotehnice din septembrie pentru semănatul rapiței de toamnă au fost depășite. Se preconizează, de asemenea, întâzieri la semănatul cerealelor de toamnă. La mijlocul lunii octombrie expiră termenele optime pentru semănatul grâului în nordul Bulgariei. În perioada următoare încep termenele agrotehnice pentru semănatul cerealelor de toamnă în regiunile sudice ale țării.



Seceta în Dobrogea îngreunează pregătirea suprafețelor pentru semănatul de toamnă al grâului. Termenele optime pentru așezarea semințelor noii culturi sunt până la sfârșitul lunii octombrie, conform oamenilor de știință de la Institutul Agronomic Dobrogea – General Toshevo.

Perioada de semănat depinde foarte mult de condițiile climatice. În ultimii ani, nu a fost neobișnuit ca campania de semănat să continue în luna noiembrie. În același timp, starea culturilor depinde foarte mult de temperaturile și precipitațiile care vor fi în noiembrie și decembrie și de măsura în care plantele se vor întări pentru a trece iarna.

Precipitațiile prognozate în a doua jumătate a perioadei următoare se așteaptă să asigure umezeala necesară pentru fazele inițiale de vegetație ale culturilor de toamnă. La sfârșitul celei de-a doua decade din octombrie, în culturile de cereale de toamnă semănate (stația agrometeorologică Targovishte) vor fi în curs faza de germinare și formarea inițială a frunzelor.

Condiții favorabile pentru finalizarea recoltării strugurilor și pentru culesul soiurilor de fructe de toamnă vor apărea la începutul și la sfârșitul perioadei.

Sursa NIMH