

În noiembrie, condițiile vor fi favorabile pentru efectuarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului și pentru semănătura de toamnă întârziată.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2023 Брой: 11/2023



În noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi și precipitații în jurul și peste normele climatice.

Precipitațiile deficitare și temperaturile neobișnuit de ridicate din octombrie au dus la adâncirea secetei existente. La mijlocul toamnei, rezervele de umiditate a solului din stratul de 50 cm sunt complet epuizate, iar în o parte din regiunile arabile, umiditatea productivă este absentă în întreg stratul de sol de un metru. În multe

zone ale țării, din cauza condițiilor nefavorabile, pregătirea pre-semănat a suprafețelor destinate semănăturilor cu culturi de toamnă a fost amânată, iar termenele agrotehnice pentru semănarea culturilor de cereale de toamnă au fost depășite.

În cazul unei semănări întârziate, se recomandă în general creșterea normei de sămânță cu între 5 și 10%, pentru a menține, în lipsa unei încovoieri productive, numărul de spice pe metru pătrat, astfel încât producțiile să fie păstrate”, împărtășește Șef Lucrător Alexiev de la IRGR „K. Malkov” din Sadovo pentru Nivabg.com.

În prima decadă a lunii noiembrie, se așteaptă o schimbare graduală, pozitivă a condițiilor agrometeorologice. La începutul lunii, se prognozează precipitații, precum și o îmbunătățire a stării hidrofizice a stratului superior de sol și a condițiilor pentru efectuarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului și a semănăturilor de toamnă întârziate.

Precipitații de semnificație economică și o creștere a rezervelor de umiditate a solului în stratul de 50 cm sunt așteptate în a doua jumătate a lunii noiembrie. În această perioadă, fazele inițiale de vegetație ale culturilor de toamnă semănate vor avea loc la temperaturi medii zilnice peste normal. La sfârșitul lunii noiembrie, se vor observa diferite faze la grâu și orz – de la încolțire până la frunza 1, a 2-a și a 3-a.

Pe parcursul lunii, nu sunt prognozate temperaturi minime critice pentru culturile de cereale de toamnă în faza de încolțire.

În noiembrie, condiții mai potrivite pentru plantarea pomilor fructiferi și pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor de toamnă în culturile pomicole, vizând limitarea infecțiilor cu tăciune, putregaiul brun timpuriu, găurirea frunzelor, cărceii piersicului și a altor patogeni care iernează, vor apărea în a doua decadă și la sfârșitul lunii.

Sursa: NIMH