

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.01.2024 Брой: 1/2024



Anomaliile climatice de la începutul iernii, cu temperaturi neobișnuit de ridicate, depășind 20–21°C în multe locuri, au condus la reluarea proceselor de vegetație la culturile semănate toamna în unele părți ale regiunilor arabile ale țării. Vremea necorespunzătoare sezonului a provocat, în unele dintre regiunile extreme sud-vestice, umflarea prematură și nedorită a mugurilor la anumite specii de arbuști și pomi fructiferi cu înflorire timpurie, cum ar fi cornul, caisul, piersicul și cireșul.

La începutul lunii ianuarie, condițiile agrometeorologice vor continua să fie determinate de temperaturi peste normal și de valori medii zilnice în regiunile arabile deasupra minimului biologic necesar pentru apariția vegetației întârziată la culturile de cereale de toamnă.

În a doua jumătate a primei decadă este prevăzută o scădere a temperaturilor și o schimbare a condițiilor agrometeorologice. Răcirea așteptată în această perioadă va pune capăt vegetației tardive a cerealelor de

toamnă și va împiedica dezvoltarea neopportună a unor specii de pomi, care altfel ar duce la reducerea rezistenței lor de iarnă. În decada a doua și a treia, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi apropiate de normele climatice, care vor menține cerealele de toamnă într-o stare de repaus.

În ianuarie, plantajele de grâu și orz vor ierna în diferite stadii fenologice. Cerealele de toamnă semănate târziu la sfârșitul toamnei, în stațiile agrometeorologice Băzovec, Nikolaevo, Kazanlăk, Sliven și Chirpan, se află în faza de încolțire și stadiul inițial de formare a frunzelor. În plantajele semănate în noiembrie din Kneža, Tărgoviște, Pazardjik, Haskovo și Ljubimec, predomină stadiul celei de-a treia frunze. O mică parte a plantajelor de grâu și orz în unele locuri din Câmpia Dunării – stația agrometeorologică Novachene – și din Podișul Traciei Superioare în regiunea Plovdiv se află în faza de încălțare, care este faza adecvată pentru iernare. În ianuarie, temperaturile minime prevăzute, până la minus 13°C, nu vor prezenta un risc pentru culturile permanente și pentru cerealele de toamnă care au intrat în faza de încălțare. În condiții fără strat de zăpadă, valori în intervalul minus 10–13°C, dacă persistă pentru o perioadă mai lungă, vor fi critice pentru plantajele semănate târziu, slab înrădăcinate. Precipitațiile prevăzute în ianuarie, în jurul și peste normă, vor spori rezervele de umiditate a solului în straturile de sol de un metru și doi metri. La sfârșitul lunii decembrie, rezervele de umiditate a solului pentru grâu în stratul de un metru din majoritatea regiunilor arabile erau peste 85–90% din capacitatea de câmp (CC).

Pe parcursul lunii, condiții mai potrivite pentru efectuarea tăierii de iarnă a speciilor de pomi cu pepeni vor apărea la începutul primei și în majoritatea zilelor decadei a treia.

Sursa: INMH