

În a treia decadă a lunii martie – risc de îngheț

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2024 Брой: 3/2024



La sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decadă a lunii martie, în multe locuri din zonele de câmpie ale țării s-au creat condiții pentru formarea înghețurilor, care au provocat daune de diferite grade înfloriturilor pomilor fructiferi.

În următoarea perioadă de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor fi din nou determinate de vreme dinamică. Sunt prevăzute temperaturi medii zilnice peste minimul biologic necesar desfășurării proceselor vegetaționale la culturile semănate toamna. La grâu și orz va continua faza de încovoietoare. Doar în locuri izolate din regiunile sudice ale țării va fi observată faza de culmare.

Conform datelor Institutului Agricol Dobrogea (IAD) - General Toshevo, din octombrie 2023 până la sfârșitul lunii februarie, cantitatea totală de precipitații este de 205 litri pe mp. Cu toate acestea, în primele două luni ale anului 2024 au căzut în total 22 litri pe mp. În același timp, au fost înregistrate temperaturi ridicate peste 16°C și în locuri până la 19,6°C. În aceste condiții, grâul de obicei nu intră în stare de repaus.

În ultimii ani, în luna aprilie asistăm la ceea ce au devenit deja fenomene comune – scăderi bruște de temperatură cu valori scăzute și înghețuri. Răceala de primăvară în combinație cu seceta poate avea un impact serios asupra grâului.

În câmpuri individuale se observă prezența septoriozei, dar este încă prea devreme pentru tratamente cu fungicide, a raportat prof. univ. dr. Ivan Kiryakov de la IAD pentru Agri.bg. La sfârșitul lunii martie, o comisie formată de Direcția Regională de Agricultură va inspecta câmpurile de grâu din regiunea Dobrogea pentru a determina starea culturilor, stadiile lor de dezvoltare și orice potențiale probleme care trebuie abordate în zonele cerealicole.

În culturile permanente vor avea loc diferite faze fenologice – de la umflarea și deschiderea mugurilor până la formarea mugurilor floriali, înflorire și frunzire. În primele zile ale perioadei sunt prevăzute înghețuri și temperaturi minime negative, ceea ce va prezenta un risc pentru culturile pomicele care sunt avansate în dezvoltare.

Precipitațiile așteptate în a doua jumătate a perioadei vor limita oportunitățile pentru lucrările de câmp. Condiții mai potrivite pentru desfășurarea activităților agrotehnice sezoniere – pregătirea solului înainte de semănat și semănatul floarea-soarelui, precum și tratamentele de protecție a plantelor în culturile agricole, vor fi disponibile la începutul perioadei. Tratamentele trebuie efectuate pe vreme calmă și la o viteză a vântului de până la 2-3 m/s. În cursul perioadei începe termenul agrotehnic optim pentru semănatul floarea-soarelui în nordul Bulgariei.

Sursa: INMH și Agri.bg