

# La sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai – vreme instabilă cu risc de formare a brumei/ înghețului și pagube la culturile agricole

Автор(и): Растителна защита

Дата: 29.04.2024 Брой: 4/2024



În următoarea perioadă de șapte zile, procesele de vegetație ale culturilor agricole vor decurge în ritmuri moderate, cu temperaturi medii zilnice în jurul normelor climatice. Precipitațiile semnificative din punct de vedere economic din a treia decadă a lunii aprilie în regiunile agricole ale țării au îmbunătățit condițiile pentru fazele inițiale de dezvoltare a porumbului și a florii-soarelui și pentru vegetația cerealelor de iarnă.

În unele locuri din Plovdiv, Stara Zagora și Sliven, au avut loc furtuni cu grindină, distrugând o mare parte din recoltă. Toate plantațiile de trandafiri din satul Banya din Sliven au fost distruse de grindină, iar viile au fost, de

асемenea, afectate.

În perioada pentru grâu și orz, vor avea loc următoarele faze: alungirea tulpinii la unele culturi din jumătatea vestică a țării și partea centrală a Câmpiei Dunării; tranziția la înspicare și înspicarea în unele zone din Bulgaria de Est și de Sud – stațiile agricole Târgoviște, Silistra, Karnobat, Kazanlâk, Plovdiv și Pazardjik. Pentru porumb și floarea-soarelui, vor avea loc răsărirea și începutul formării frunzelor, în funcție de datele de semănat.

Pentru viță de vie, se va observa formarea frunzelor (1-3 frunze) și separarea ciorchinilor.

Pentru cerealele de iarnă, în timpul fazelor de alungire a tulpinii și înspicare, daunele la plante sunt cauzate de gândacul comun al frunzelor de cereale și de ploșnița cerealelor. Culturile ar trebui, de asemenea, inspectate pentru dezvoltarea făinării.

Pentru speciile pomicole, după înflorire, tratamentele continuă împotriva putregaiului brun timpuriu la sămburoase, a rapănului și a făinării la semințoase. Pentru viță de vie, pulverizările fitosanitare vizează protejarea culturii de mană și făinare și de activitatea dăunătoare a acarianului galben al viței de vie.

Vremea instabilă prognozată, cu precipitații, va limita temporar posibilitățile de desfășurare a activităților agrotehnice. La începutul perioadei, în câmpiile înalte din Bulgaria de Vest, rămâne o probabilitate de formare a brumei și de deteriorare a culturilor agricole.

*Sursa NIMH*