

Activități agrotehnice în livadă în mai

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.05.2024 *Брой:* 5/2024



În majoritatea zilelor primei decade a lunii mai, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme instabilă, cu ploi frecvente, ceea ce va crea condiții pentru creșterea fondului infecțios al bolilor fungice. Procesele vegetative la culturile agricole vor decurge în ritm moderat, la temperaturi apropiate de normele climatice.

După vremea instabilă de până la jumătatea lunii, în a doua jumătate a lunii mai este așteptată o schimbare a condițiilor agrometeorologice. Se prognozează o creștere a temperaturilor medii zilnice. Ploi sunt așteptate la sfârșitul lunii mai. Pe parcursul întregii luni, rămâne posibilitatea furtunilor cu grindină și riscul de deteriorare a culturilor agricole.

În pepinierele pomicole

În pepiniere, se monitorizează dezvoltarea corectă a mugurilor altoiți. Dacă este necesar, se efectuează o nouă dezinghirișare a lăstarilor apăruiți din portaltoi.

Dacă există riscul de inelare, legăturile de pe portaltoi altoiți din nou în primăvară sunt slăbite.

Se cultivă răsadnițele, plantele mamă și pepinierele. Dacă este necesar, plantele din răsadnițe sunt rărite.

În plantațiile pomicole

La sfârșitul înfloririi, stupii sunt mutați într-o altă locație – la cel puțin 5 km distanță.



În livezile de piersici nou înființate, cu coroană de tip vas sau vas îmbunătățit, se efectuează tăieri de formare. Se acordă atenție unei înrădăcinări și dezvoltări corespunzătoare a pomilor din livezile nou plantate – prășit, dezinghirișat, irigat dacă este necesar. Pomii din plantațiile tinere și dense sunt legați de o structură de sârmă. Ramurile puternice de doi și trei ani sunt îndoite și legate de sârme pentru a le reduce vigoarea de creștere. În plantațiile tinere – de 2 și 3 ani, o parte din fructele de pe ramura conducătoare - centrală sunt îndepărtate. Lucrările de rărire a fructelor de piersic continuă. După finalizarea definitivă a căderii fructelor, plantațiile sunt irigate. Materia organică din culturile pentru îngrășământ verde este încorporată prin arat.

Solul este menținut curat de buruieni și afânat prin cultivare superficială regulată cu un cultivator sau o grapă. La sfârșitul lunii, pomii roditori sunt fertilizați cu 15-20 kg/dka azotat de amoniu sau aceeași cantitate de alt îngrășământ azotat.

Recoltarea soiurilor timpurii de cireșe continuă.

În plantațiile de căpșuni



Continuă plantarea de primăvară-vară a răsadurilor de căpșuni, depozitate în frigider. După plantare, se aplică irigarea prin aspersiune fină. Zonele plantate în aprilie sunt plivite. În regiunile mai înalte, paie sunt așezate sub tulpinile florale până la sfârșitul lunii.

Recoltarea continuă. Când fructele sunt transportate pe distanțe mai lungi, pot fi recoltate puțin mai devreme. În caz de secetă în timpul coacerii fructelor, este necesară aplicarea irigării prin aspersiune fină sau irigare prin șanțuri.

În plantațiile de zmeură

Se efectuează cultivarea regulată a solului. Lăstarii unor soiuri sunt legați de structura de susținere, în timp ce pentru alte soiuri se are grijă să nu cadă în spațiile dintre rânduri.



În timpul înfloririi, este recomandabil să se asigure două familii de albine la 10 dka.

În plantațiile de coacăz negru



Lucrările de îngrijire continuă – cultivarea și irigarea zonelor de înrădăcinare. Lăstarii radiculari slabi și superflui sunt îndepărtați. În caz de secetă, se efectuează udări abundente. Încep lucrările de organizare a recoltării fructelor de coacăz negru.

În plantațiile cu alte culturi

Portaltoii de lămâi sunt altoiți prin oculare. Altoirea de kaki continuă. Suprafața solului este menținută curată de buruieni și afânată regulat prin cultivare superficială. Se asigură udări frecvente și regulate până în a doua decadă a lunii.



Continuă plantarea de *Actinidia chinensis* în câmp deschis. După plantare, se udă. Vișele de Actinidia sunt legate regulat de ramurile auxiliare de susținere. Tulpina nu trebuie să se înfășoare în jurul ramurii de susținere, iar lăstarii laterali de pe aceasta sunt îndepărtați. Trei familii de albine sunt asigurate la 10 dka de Actinidia.