


În a treia decadă a lunii mai, pentru cerealele de iarnă bine aprovizionate cu umiditate, va avea loc formarea și umplerea bobului.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 23.05.2024 Брой: 5/2024



După vremea rece pentru sezon de la mijlocul lunii mai, în a treia decadă a lunii, se preconizează o creștere semnificativă a temperaturilor, normalizarea condițiilor termice și activarea proceselor de vegetație la culturile agricole.

Precipitațiile așteptate la sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decade în majoritatea regiunilor agricole vor menține rezervele de umiditate a solului în limite optime în stratul de 50 și 100 cm – peste 85% din CC. Pe parcursul perioadei, pentru culturile de cereale de iarnă bine aprovizionate cu umiditate, va avea loc

formarea și umplerea bobului. În regiunile de sud-est (agrostația Karnobat), la orz, mai devreme decât de obicei, se va observa și faza de coacere în lapte.

Formarea frunzelor va avea loc la porumb și floarea-soarelui. La sfârșitul perioadei, pentru floarea-soarelui semănată în perioada agrotehnică, se va observa și începutul formării inflorescenței.

Vremea instabilă prognozată cu ploi frecvente în perioada următoare va menține un fond infecțios crescut de la patogeni fungici: putregaiul brun târziu la fructele în curs de coacere ale soiurilor timpurii de cireș, putregaiul cenușiu la căpșuni, mana la vița de vie și culturile legumicole, rapănul la speciile pomicele semănătoare etc.



Musca cireșelor

În a treia decadă a lunii mai, musca cireșelor cauzează pagube soiurilor de cireș de mijlocul timpurii. Pentru a limita pagubele cauzate de acest dăunător, se recomandă un tratament la începutul fazei de coacere a fructelor (când fructele de cireș încep să se coloreze ușor în roz) cu un insecticid cu o perioadă scurtă de pauză.

În vii, ar trebui să continue monitorizarea prezenței și activității dăunătoare a larvelor din prima generație a moliei strugurilor, iar în culturile pomicele – pentru viermele merelor, molia prunelor și molia orientală a fructelor.

În această perioadă, conținutul crescut de umiditate din straturile superioare ale solului va limita lucrările sezoniere ale solului și lupta împotriva vegetației buruienoase concurente.

Sursa NIMH