


Iunie – de la vreme instabilă cu precipitații la condiții de căldură peste normal

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2024 Брой: 6/2024



În iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme instabilă cu precipitații, în jurul și peste norma lunară, ceea ce va menține rezerve bune și foarte bune de umiditate în stratul de sol de 50cm și 100cm – peste 75-80% din FC (Capacitatea de Câmp). Niveluri mai scăzute ale rezervelor de umiditate a solului sunt prognozate pe alocuri în regiunile extreme de nord-est și sud-vest (Razgrad, Ruse, Silistra, Sandanski), unde precipitațiile din mai au fost sub norma lunară.

La începutul lunii iunie, dezvoltarea culturilor agricole va decurge într-un ritm accelerat, în condiții termice peste normal. Datorită temperaturilor ridicate din timpul vegetației de primăvară a grâului și orzului, acestea își vor finaliza dezvoltarea mai devreme decât de obicei. În primele zece zile ale lunii iunie, va fi observată maturitatea

cerată în masă pentru orz în zonele de câmp, iar la sfârșitul perioadei de zece zile - maturitatea deplină. Pentru grâu în această perioadă, va avea loc maturitatea lăptoasă, tranziția la cea cerată și maturitatea cerată.

În majoritatea zilelor celei de-a doua decade, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. La mijlocul decadei, culturile cerealiere de iarnă din câmpurile înalte vor intra în faza de coacere. Pentru porumb, va avea loc formarea frunzelor, iar pentru floarea-soarelui, va predomina formarea inflorescenței.

Pe parcursul celei mai mari părți a perioadei 7-13 iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme caldă cu probabilitate de precipitații locale și grindină. Temperaturile maxime vor depăși 30°C pe tot parcursul perioadei, atingând 38°C în Câmpia Traciei, ceea ce reprezintă o premisă pentru stres termic și deteriorarea condițiilor pentru dezvoltarea normală a plantelor cultivate în stadiile lor vegetative și generative.

La începutul celei de-a doua decade a lunii iunie, va avea loc formarea frunzelor la porumb; pentru floarea-soarelui semănată în termenul agricol optim - formarea inflorescenței; pentru leguminoase (fasole, soia) - înmugurirea și înflorirea. Pentru orz în zonele de câmp, va predomina maturitatea cerată. Pentru grâu, va avea loc maturitatea lăptoasă și cerată în masă. Pentru rapiță, va fi observată faza de coacere.

Condițiile termice prognozate peste normal în timpul celei de-a treia decade a lunii iunie vor accelera vegetația culturilor de primăvară, iar unele dintre ele vor intra în faze reproductive ale dezvoltării lor. Pentru culturile de floarea-soarelui semănate în termenul agricol optim, va fi observat începutul fazei de înflorire, iar pentru hibridii de porumb mai timpurii - apariția paniculelor și scuturarea polenului. În această perioadă, sunt prognozate temperaturi maxime de până la 35-36°C, ceea ce va afecta negativ înflorirea și fertilizarea la culturile de legume.

În iunie, precipitațiile frecvente prognozate sunt o premisă pentru dezvoltarea bolilor fungice: putregaiul brun târziu, rapănul și făinarea la pomii fructiferi; manele la culturile de legume; mana, făinarea și putregaiul cenușiu la vița de vie. Condiții mai favorabile pentru efectuarea stropirilor de protecție a plantelor vor fi create în a doua jumătate a lunii.

! Temperaturile ridicate și umiditatea atmosferică scăzută vor limita posibilitățile de efectuare a măsurilor de protecție a plantelor și vor îngreuna lucrările de câmp.

