

Activități agrotehnice în livadă în luna iulie

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.07.2024 Брой: 7/2024



În majoritatea zilelor din a doua și a treia decadă a lunii iulie, se preconizează vreme relativ uscată și foarte caldă, cu temperaturi maxime între 35-40⁰C. Temperaturile ridicate prognozate pentru iulie și vremea relativ uscată vor limita dezvoltarea bolilor fungice în plantațiile perene, cu excepția făinărilor. Precipitațiile preconizate în jurul și sub norma lunară vor impune implementarea unui regim sporit de irigare.

În pepinierele pomicele

Răsadnițele sunt irigate și lucrate regulat pentru a asigura cel mai mare procent posibil de material portaltoi standard. Plantațiile-mamă sunt irigate și, dacă este necesar, înălțate.

Pentru a asigura condiții pentru o bună dezvoltare a plantelor altoite, în parcelele de pepinieră din anul doi se efectuează dez muguritul atunci când este necesar. Se efectuează lucrări regulate de lucrare a solului și irigare, în special în pepinierele de păr.

În parcelele de pepinieră din primul an, începe altoirea portaltoielor, iar în cele în care mugurii nu au prins, se efectuează realtoirea. La aproximativ două săptămâni după altoire, se inspectează legăturile. Cele care s-au tăiat în scoarță sunt slăbite.

În livezile pomicole

Se continuă lucrările de îndoire a ramurilor scheletice la formarea pomilor în palmetă.

Prin irigare, se menține umiditatea solului peste 70% din capacitatea de câmp.

Cu ajutorul greblei disc, a cultivatorului, a frezei rotative și a frezei rotative cu secțiune decalată, suprafața solului dintre rânduri și în rânduri este menținută lucrată și fără buruieni.



Se continuă recoltarea cireșelor dulci și acre, iar începe și recoltarea în masă a caiselor și piersicilor.

În plantațiile de căpșuni

Se continuă îngrijirea irigării plantațiilor nou înființate de căpșuni, în special a celor plantate în iunie. În regiunile mai joase și mai calde, unde recoltarea fructelor s-a încheiat, paiele sunt adunate, îndepărtate și arse.



Recoltarea fructelor continuă în locurile mai înalte și mai răcoroase.

După îndepărtarea paielor, plantațiile sunt irigate și lucrate, după ce au fost fertilizate anterior cu 10-12 kg de azotat de amoniu pe decar.

Plantațiile-mamă destinate producerii de material săditor sunt irigate, fertilizate cu 15-20 kg de azotat de amoniu pe decar și săpate. Paliții din plantațiile din care nu se ia material săditor sunt tăiați.

Se stabilesc și pregătesc noi suprafețe pentru plantații de căpșuni pentru plantarea de toamnă în câmp deschis. Înainte de lucrarea profundă a solului, suprafața este fertilizată cu 2-4 t de gunoi de grajd, 60-80 kg de superfosfat și 20-30 kg de sulfat de potasiu pe decar.

În plantațiile de zmeur

Se continuă îngrijirea irigării și lucrării solului la noile plantații. Plantațiile care fructifică sunt irigate și lucrate. Norma de irigare este de 50-60 dm³ pe decar.



Se efectuează recoltarea în masă a fructelor.

Se îngrijește de plantațiile-mamă de zmeur – irigare și lucrare a solului, pentru a asigura cantitatea maximă de material săditor – vlăstari.

Plantațiile sunt inspectate, se elimină plantele atipice ale altor soiuri, iar lăstarii vechi care au fructificat sunt tăiați, adunați și arși.

În plantațiile de coacăz negru

Se continuă îngrijirea răsadnițelor. Solul este irigat și lucrat, iar în plantațiile tinere și fructifere nu se permite infestarea cu buruieni.

Plantațiile sunt fertilizate cu azot (1/3 din norma anuală).

Se efectuează recoltarea în masă a fructelor. În timpul recoltării, plantele atipice ale altor soiuri sunt marcate pentru a fi scoase ulterior, la fel și plantele bolnave și slabe. După recoltare, se elimină lăstarii spărțiți, subdezvoltați și în exces.

În plantațiile cu alte culturi

Se marchează soiurile și formele de smochin dorite pentru obținerea de butași. Se iau butași de actinidie, dafin, aronia, cătină și rodie pentru înrădăcinare într-o seră cu ceață artificială. Butașii sunt pregătiți și tratați cu o soluție de acid indolilbutiric timp de 5 secunde. Aceștia sunt înrădăcinați în sere cu ceață artificială într-un substrat format din două părți perlite și o parte turbă.

Începe altoirea portaltoielor de curmal caucazian cu soiuri de curmal și a răsadurilor de actinidie cu soiuri cultivate.

Se continuă legarea vițelor de actinidie de spalierul cu sârmă. Se efectuează tăierea de vară a actinidiei. Spalierul cu sârmă este instalat deja la plantare, iar firele sunt ridicate la 1-1,20 m și 1,80-2 m deasupra suprafeței solului.

Jujuba și fisticul sunt altoite.

Se recoltează fructele de smochin, iar spre sfârșitul lunii începe recoltarea fructelor de cătină și aronia.