

De ce și cum să protejăm pomii fructiferi în septembrie

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.09.2024 *Брой:* 9/2024



Spre sfârșitul perioadei de vegetație, dezvoltarea bolilor încetinește, dar nu încetează complet.

Precipitațiile prognozate în timpul celei de-a doua și a primei jumătăți a celei de-a treia decadă vor crește riscul de dezvoltare a patogenilor fungici pe cultura fructelor care se coc – putregaiul brun târziu, tăvița târzie pe fructele soiurilor târzii de pomi fructiferi.

Densitatea populației de dăunători scade semnificativ. Mulți dintre ei au intrat în stadii inactive – pupe, ouă. Cu toate acestea, larvele eclozate târziu ale celei de-a doua generații de molii fructelor continuă să cauzeze

viermănatate la fructe. Alți dăunători sunt, de asemenea, dăunători. Prin urmare, activitățile de protecție a plantelor continuă în cursul lunii.

În livezi

Spațiile de depozitare a fructelor sunt dezinfectate. Această operațiune este efectuată de un specialist!



Molia țigance – *Lymantria dispar*

Pentru a determina populația de iernare a moliei țigance, se numără depunerile de ouă de pe trunchiuri și ramurile groase a 40–60 de pomi, iar pentru molia lackey – inelele de ouă de pe ramurile de doi, trei și patru ani.

Fructele de piersic sunt inspectate în punctele de manipulare pentru a detecta molia orientală a fructelor în zonele unde aceasta nu a apărut încă.

Aproximativ două săptămâni înainte de recoltare, livezile de mere și pere ale căror fructe sunt destinate depozitării sunt tratate cu Captan 80 WG (150–180 g/da) pentru a le proteja împotriva tăviței târzii și a altor boli care se dezvoltă în spațiile de depozitare a fructelor.

Pentru a determina densitatea populației de gândac al mugurilor de păr la sfârșitul lunii, se scutură 10 pomi la fiecare 500 de ari, împrăștiați în livadă – inițial la două zile, iar după ce sunt găsite primele insecte, zilnic.

Castanii se tratează prin pulverizare la începutul lunii, înainte de depunerea ouălor, cu Coragen 20 SC (18–30 ml/da) sau cu un alt insecticid de contact pentru combaterea gândacului castanului. Pulverizarea se repetă de încă două ori la intervale de 7–10 zile.

În plantațiile de căpșuni

Înainte de transplantare, pentru suprafețe fără buruieni, plantațiile de căpșuni sunt tratate cu Roundup Energy (300–500 ml/da pentru buruieni anuale și bienale și 500–800 ml/da pentru buruieni perene).



Gândacul rădăcinilor de căpșun

Plantațiile de căpșuni sunt irigate cu unul dintre insecticide – Decis 100 EC (17,5 ml/da) sau un alt produs pe bază de deltametrină, Mospilan 20 SP (30 g/da), Naturalis (300 ml/da) până când solul este umezit la o adâncime de 15 cm împotriva larvelor gândacilor rădăcinilor.

Materialul de plantare pentru căpșuni este inspectat pentru boli și dăunători care se transmit odată cu acesta – pete foliare albe și purpurii-brună, gândaci ai rădăcinilor, nematodul căpșunului, acarianul căpșunului, boli virale, etc.

Puronii de căpșuni sunt dezinfectați dacă sunt infestați de acarianul căpșunului sau nematodul căpșunului prin scufundarea lor timp de 13–15 minute în apă la o temperatură de 45–50 °C.