

Întârzierea semănatului rapiței de toamnă și condițiile pentru infecții și dezvoltarea patogenilor în culturile agricole târzii

Автор(и): Растителна защита

Дата: 18.09.2024 Брой: 9/2024



După seceta prelungită, la începutul lunii septembrie, în multe zone ale țării (Silistra, Varna, Dobrich, Stara Zagora, Burgas, Haskovo, Sandanski) au căzut precipitații semnificative din punct de vedere economic, de peste 30–40 l/m².

Aceste precipitații au venit târziu chiar și pentru culturile de câmp tardive, care, ca urmare a deficitului de umiditate al solului și a temperaturilor estivale peste normal, și-au încheiat dezvoltarea mult mai devreme decât termenele obișnuite.

De asemenea, în cursul acestei săptămâni, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă. Sunt prevăzute precipitații în perioada respectivă, care vor îmbunătăți rezervele de umiditate din straturile superioare ale solului și condițiile pentru efectuarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului.

Datorită secetei, lucrările pre-semănat de pregătire a solului pentru suprafețele destinate semănatului cu rapiță de toamnă, o cultură care necesită o pregătire precisă a solului, au fost amânate. Din acest motiv, în multe zone ale țării, semănatul rapiței se va efectua după termenele agrotehnice optime. Acestea expiră la sfârșitul celei de-a doua decadă a lunii septembrie.

În majoritatea zilelor perioadei, vremea răcoroasă prevăzută, cu precipitații frecvente, va crea condiții pentru infecții și dezvoltarea patogenilor la culturile agricole tardive: putregaiul brun târziu la pomii fructiferi, putregaiul cenușiu la viță de vie, mană la culturile legumicole.



În a doua decadă a lunii septembrie, la varza cultivată pentru producția de toamnă, trebuie monitorizați dăunătorii: omizile fluturului alb al varzei, molia varzei, molia diamant, iar atunci când densitatea acestora depășește pragul economic de dăunare (3–5 omize pe plantă), este necesar un tratament cu insecticide cu un interval scurt pre-recoltare.

Perioada iminentă este potrivită pentru semănatul spanacului și a altor legume frunzoase pentru producția de toamnă.

Sursa: NIMH