

Octombrie – precipitații de importanță agronomică și condiții bune pentru dezvoltarea rapiței de toamnă

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.10.2024 Брой: 10/2024



În octombrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și peste normele climatice și precipitații apropiate de mediile lunare. După seceta estivală, ploile semnificative din punct de vedere economic din septembrie, în anumite zone din est și localități din vestul Bulgariei, au îmbunătățit conținutul de umiditate al straturilor superioare de sol și condițiile pentru efectuarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului.

Precipitațiile de la sfârșitul lunii septembrie au fost distribuite neuniform. În multe locuri din Bulgaria Centrală și de Nord-Est s-au înregistrat precipitații de până la și peste 30-35 l/m² (Veliko Tărnovo - 40 l/m², Ruse - 43 l/m²,

Razgrad - 36 l/m², Silistra - 45 l/m², Varna - 45 l/m², Dobrici - 53 l/m²), ceea ce a dus la o îmbunătățire substanțială a rezervelor de umiditate din straturile superioare de sol și a condițiilor pentru desfășurarea lucrărilor sezoniere de pregătire a solului. Spre deosebire de regiunile centrale și estice, în unele părți ale Bulgariei de Vest și de Sud, precipitațiile de la începutul toamnei nu au avut semnificație economică. În aceste părți ale țării, solul uscat și compactat îngreunează serios aratul adânc și lucrările de pregătire pre-semănat a suprafețelor destinate semănăturilor cu culturi de toamnă.

În majoritatea zilelor primei decadă a lunii octombrie nu se prognozează precipitații semnificative, iar condițiile vor permite pregătirea terenurilor și semănarea acestora cu culturi cerealiere de toamnă. Seceta estivală a împiedicat semănarea la timp a rapiței de toamnă și, în unele locuri din regiunile arabile ale Bulgariei Centrale, suprafețele vor fi semănate în afara termenelor agrotehnice. Este foarte probabil ca culturile semănate târziu să nu intre în faza de rozetă în timpul vegetației de toamnă, ceea ce garantează iernarea cu succes a culturii fără daune.

În octombrie au loc perioadele agrotehnice optime pentru semănarea culturilor cerealiere de toamnă. Termenul pentru Bulgaria de Nord este în prima jumătate a lunii, pentru Bulgaria de Sud în a doua jumătate a lunii, iar pentru regiunile de lângă Marea Neagră în a treia decadă. Precipitațiile așteptate la sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decadă, precum și în a doua jumătate a celei de-a treia decadă a lunii, vor avea o importanță semnificativă pentru desfășurarea normală a stadiilor inițiale de vegetație ale grâului și orzului. În octombrie, în funcție de datele de semănat, la grâu se vor observa următoarele faze – încolțire, primul și al treilea frunză.



Vremea caldă prognozată în a doua jumătate a lunii va fi o premisă pentru creșterea populației de șoarece de câmp. Terenurile cu culturi semănate toamna trebuie monitorizate, iar când este atins pragul economic de dăunare – PED: 2 colonii active/ha – trebuie tratate.

Condiții pentru lucrările de câmp vor exista la mijlocul celei de-a doua și în prima jumătate a celei de-a treia decadă, când se prognozează vreme relativ uscată.



În octombrie, în livezile de măr și păr afectate de tăciune, pentru a reduce infecția, este recomandat la începutul căderii frunzelor, după recoltarea fructelor, să se efectueze un tratament cu soluție de uree 5%.

Pentru speciile cu sâmbure, după căderea în masă a frunzelor, se recomandă pulverizarea cu amestec bordelez 2% împotriva agenților cauzatori ai găurilor de glonț, putregaiului brun timpuriu și bubocului de piersic.

La începutul lunii octombrie se prognozează înghețuri la sol, care vor limita posibilitățile de producție suplimentară de la culturile legumicole târzii sensibile la îngheț.

Sursa: INMH