

Activități agrotehnice în livadă în luna octombrie

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 *Брой:* 10/2024



În octombrie, la toate speciile de pomi fructiferi, procesul de acumulare a nutrienților de rezervă are loc activ.

Pe parcursul lunii, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și peste normele climatice și de precipitații apropiate de normele lunare.

În majoritatea zilelor primei decadă a lunii octombrie, nu se prognozează precipitații semnificative. Se așteaptă precipitații la sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decadă, precum și în a doua jumătate a celei de-a treia decadă a lunii.

Condiții pentru lucrările de câmp vor apărea la mijlocul celei de-a doua și în prima jumătate a celei de-a treia decadă, când se prognozează vreme relativ uscată.

În pepinierele de pomi fructiferi



Se are grijă de păstrarea capacității germinative a semințelor speciilor cu sâmbure colectate pentru stratificare.

Începe pregătirea pentru ridicarea portaltoanelor din răsadnițe și a pomilor de doi ani din pepinieră.

Portaltoanele din răsadnițe și pomii altoiți se ridică după încheierea perioadei lor de vegetație – în a doua jumătate a lunii octombrie și în noiembrie.

Plantele nu trebuie să aibă frunze. Dacă frunzele nu au căzut, se folosește în acest scop clorură de calciu 0,1-0,2%. Irigația facilitează ridicarea.

În livezi



Continuă recoltarea migdalelor și a unor fructe de prun.

Recoltarea soiurilor de măr și păr toamnă-iarnă trebuie finalizată cel târziu până la mijlocul lunii.

Solul dintre rânduri din livezile de un an și cele tinere este lucrat adânc.

Dacă nu s-a efectuat fertilizarea prealabilă plantării cu îngrășăminte fosfatice și potasice, se aplică 50-60 kg de superfosfat și 20-22 kg de sulfat de potasiu – sau un alt îngrășământ fosfatic și potasic în aceeași cantitate pe decar –.

Îngrășămintele fosfatice și potasice sunt incorporate adânc și în livezile aflată în rod.



În plantațiile de căpșuni

Continuă înființarea de noi plantații de căpșuni.

Plantarea mustăților trebuie finalizată cel târziu până la mijlocul lunii. Mustățile trebuie să fie prinse, cu o cantitate mică de sol în jurul rădăcinilor. După plantare, se efectuează irigație cu $0,5-1 \text{ dm}^3$ de apă pe plantă.

Se efectuează lucrarea finală a plantațiilor aflate în rod – la o adâncime de 10-15 cm, plantele fiind ușor încărcate cu pământ.

Continuă ridicarea și pregătirea pentru păstrarea la rece a mustăților destinate plantării primăvară-vară.

În plantațiile de zmeur

Se pregătesc suprafețe pentru înființarea de noi plantații de zmeur.

Plantațiile aflate în rod sunt fertilizate cu 2-3 t de gunoi de grajd, 20-30 kg de superfosfat și 10-15 kg de sulfat de potasiu – sau un alt îngrășământ fosfatic și potasic în aceeași cantitate pe decar, după care îngrășămintele sunt arate adânc – la o adâncime de 20-25 cm.

În plantațiile de coacăz negru

În condiții de uscăciune, plantațiile aflate în rod și cele tinere sunt irigate.

Se efectuează fertilizarea de toamnă cu 1-2 t de gunoi de grajd, 20-40 kg de superfosfat și 10-15 kg de sulfat de potasiu – sau un alt îngrășământ fosfatic și potasic în aceeași cantitate pe decar. Solul dintre rânduri este lucrat la o adâncime de 15-18 cm, iar în apropierea plantelor – la 5-6 cm.

În plantațiile cu alte culturi

Se efectuează arătura de toamnă la o adâncime de 18-20 cm, ceea ce contribuie la o bună acumulare a umidității solului din precipitațiile de iarnă.

După al treilea an, partea aeriană a plantațiilor de dafin este tăiată până la 20-25 cm de gâtul rădăcinii. Tulpinile tăiate sunt duse într-o încăpere uscată, bine ventilată pentru uscarea frunzelor.



Începe recoltarea curmalei japoneze, rodiei și kiwi (Actinidia).

La sfârșitul lunii, în caz de risc de îngheț și vreme relativ uscată, toate plantele de dafin (frunze de dafin, laur) sunt încărcate cu pământ cu ajutorul plugului.

Continuă recoltarea fructelor de smochin.

Continuă îngrijirea butașilor verzi de Actinidia, aronia, cătină și altele, puși la înrădăcinare.

Începe colectarea semințelor de terebint pentru producerea portaltoanelor de fistic.