

Activități de protecție a plantelor în livadă în luna octombrie

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 Брой: 10/2024



La începutul lunii octombrie se prognozează înghețuri.

În octombrie, în livezile de măr și păr afectate de tăciune, pentru reducerea infecției este indicat, la începutul căderii frunzelor și după recoltarea fructelor, să se efectueze un tratament cu soluție de uree 5%.

Pentru speciile cu sâmbure, după căderea în masă a frunzelor, se recomandă pulverizarea cu amestec Bordeaux 2% împotriva agenților cauzatori ai găuririi frunzelor, putregaiului brun timpuriu și bubocului de piersic.

În livezi

În pomii fructiferi se așează cuiburi artificiale și hrănitore pentru a atrage păsările utile.

Capcanele din bandă de carton ondulat cu omizile prezente ale moliei merelor, moliei prunului și moliei nucului se adună și se așează în cuști suspendate în livezi – ciocănitorele și alte păsări distrug omizile din bandă.



Pe trunchiul fiecărui pom din livezile infestate cu molia de iarnă se așează o bandă lipicioasă la o înălțime de 20–100 cm. Bandele sunt confecționate din hârtie de 20 cm lățime, cu marginile superioară și inferioară legate. Pentru acoperire se folosește un adeziv cu uscare lentă. Pentru a împiedica insectele să se ascundă înainte de a ajunge la bandă, coaja crăpată de la bandă până la suprafața solului se îndepărtează prin zgâriere în prealabil.

Fructele de măr și păr se inspectează la punctele de sortare și manipulare pentru prezența păduchelui californian al scleroțienilor și a păduchelui dudului în zonele neinfestate.



Cuiburile de omizi ale moliei americane se numără pentru a determina densitatea populației dăunătorului.



Scuturarea pomilor, începută la sfârșitul lunii septembrie, continuă pentru a determina densitatea populației gândacului mugurilor de păr. Când densitatea depășește pragul economic, înainte de depunerea ouălor, pomii

se pulverizează cu un insecticid de contact din orice grupă – Decis 100 EC (12,25 ml/da) sau alt produs pe bază de deltametrină, Sumi Alpha 5 EC (0,03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/da), Lamdex extra (100–120 g/da) și altele.

Livezile de păr se tratează împotriva psilei părului cu unul dintre insecticidele – Bermectin (40–120 ml/da) sau alt produs pe bază de abamectină, Voliam Targo 063 SC (75 ml/da), Imidan 50 WG (150 g/da), Delegate 250 WG (30 g/da), Deka EC (50 ml/da) sau alt produs pe bază de deltametrină, Movento 100 SC (0,12–0,15%), Naturalis (100–200 ml/da), Sineis 480 SC (30–44 ml/da), Flipper (1–2 l/da).



Lăstarii cu păduchele lanos al mărului parazițați de viespea parazitoidă *Aphelinus mali* se taie și se păstrează într-un loc răcoros și la umbră sub un adăpost. Păduchii lanosi ai mărului care conțin această viespe sunt de culoare neagră și nu au orificiu de ieșire. În primăvara anului următor, aceștia sunt folosiți pentru combaterea biologică.