

Noiembrie – condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi și precipitații apropiate de normele climatice

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.11.2024 Брой: 11/2024



În noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi și precipitații apropiate de normele climatice.

Seceta accentuată din octombrie a împiedicat semănarea culturilor de cereale de toamnă, iar o parte din suprafețele planificate vor fi semănate în noiembrie, după termenele agrotehnice. Ca urmare a precipitațiilor sub normale din octombrie, rezervele de umiditate din sol din straturile de 50 și 100 cm în majoritatea zonelor țării, cu excepția unor localități din regiunile de nord-est (Dobrogea), sunt neobișnuit de scăzute pentru mijlocul

toamnei – în unele locuri sub 50% din capacitatea de câmp (stațiile agrometeorologice: Knezha, Bazovets, Kyustendil, Sandanski, Plovdiv, Pazardzhik, Chirpan).

În prima jumătate a primei decadă a lunii noiembrie nu se așteaptă precipitații, iar factorul limitativ pentru dezvoltarea grâului, orzului și rapiței de toamnă în majoritatea regiunilor arabile rămâne deficitul de umiditate din sol.

După temperaturile peste sezon de la sfârșitul lui octombrie și începutul lui noiembrie, se prognozează o răcire și o schimbare a condițiilor agrometeorologice. În majoritatea zilelor de la începutul lui noiembrie, temperaturile vor fi sub normele climatice, dar peste minimul biologic necesar vegetației culturilor de cereale de toamnă. Pe parcursul perioadei nu se așteaptă precipitații de importanță economică, iar factorul limitativ pentru dezvoltarea culturilor semănate toamna rămâne deficitul de umiditate din sol. La începutul lui noiembrie, la culturile de cereale de toamnă semănate până la mijlocul lui octombrie, se vor observa fazele de încolțire și formare a 1–2 frunze.

Riscul de la muștele cerealelor nu scade niciodată

În stadiile inițiale de vegetație ale grâului și orzului, culturile trebuie monitorizate pentru dăunători. Pagube sunt provocate de șoarecele de câmp comun, de larvele gândacului frunzar al grâului și de muștele cerealelor, iar atunci când densitatea acestora depășește pragul economic de dăunare, sunt necesare măsuri de protecție a plantelor în timp util.



Larve de muscă suedeză

Precipitații și o îmbunătățire treptată a rezervelor de umiditate din straturile superioare ale solului sunt așteptate în a doua jumătate a primei și pe parcursul celei de-a doua decadă a lunii noiembrie.



Cel mai periculos dăunător al culturilor de cereale este gândacul frunzar al grâului (Zabrus tenebrioides), care atacă grâul, orzul, porumbul, ovăzul și o serie de specii de ierburi.

În a treia decadă, valorile prognozate ale temperaturilor medii zilnice, în jurul și peste normalul pentru perioadă, vor depăși minimul biologic necesar vegetației culturilor de toamnă.

La sfârșitul lui noiembrie, grâul și orzul vor fi în diferite stadii de creștere – de la încolțire până la 1, 2 și 3 frunze. Stadiul celei de-a treia frunze va predomina la cerealelor de toamnă semănate în octombrie. La rapiță, doar o parte din culturi va reuși să intre în stadiul de formare a rozetei (5–7 frunze) pe parcursul lunii noiembrie.

Pe parcursul lunii, temperaturile minime prognozate, până la minus 7°C, sunt peste nivelurile critice pentru culturile de cereale de toamnă în stadiul de încolțire.

În noiembrie, condițiile pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor toamna în livezi vor fi favorabile la începutul lunii, la mijlocul celei de-a doua și în majoritatea zilelor celei de-a treia decadă. Pentru speciile cu fructe pepene (măr, păr), pentru limitarea infecțiilor cu tăciune, se recomandă tratament cu soluție de uree 5%. Pentru speciile cu sâmbure, după căderea masivă a frunzelor, este necesară stropirea cu amestec Bordeaux 2% împotriva agenților patogeni ai găurilor de împușcătură, putregaiului brun timpuriu, buboiului de piersic și a altor patogeni.

A doua jumătate a lunii noiembrie este o perioadă potrivită pentru plantarea pomilor fructiferi.