

Precipitațiile inegal distribuite în țară duc la diferențe în starea fenologică a culturilor de cereale de toamnă.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 20.11.2024 Брой: 11/2024



Până la sfârșitul celei de-a doua și începutul celei de-a treia decadă a lunii noiembrie, acestea vor fi determinate de temperaturi medii zilnice peste normele climatice și peste minimul biologic necesar vegetației culturilor de cereale de toamnă.

Pe parcursul perioadei, nu se preconizează precipitații semnificative și modificări ale nivelului rezervelor de umiditate a solului toamna. Precipitațiile căzute în perioada trecută s-au distribuit neuniform. În multe locuri din

regiunile nord-vestice, în Câmpia Dunării de Jos și în părțile sudice extreme ale țării, s-au înregistrat precipitații sub 10-12 l/m² – complet insuficiente pentru a depăși deficitul de umiditate la culturile de cereale de toamnă.

În unele dintre regiunile estice (Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Karnobat) au avut loc precipitații semnificative – peste 25-30 l/m². În aceste regiuni, s-a produs o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului din straturile superioare și a condițiilor pentru vegetația culturilor semănate toamna.

În timp ce în țară octombrie și începutul lui noiembrie au fost perioade de secetă și lipsă de precipitații agricol eficiente, în regiunea Dobrogei se observă rezerve suficiente de umiditate a solului, care contribuie la dezvoltarea bună a suprafețelor cultivate cu grâu. Temperaturile permit încolțirea normală acolo unde umiditatea este suficientă. Temperaturile mai scăzute din Dobrogea protejează suprafețele cultivate toamna de atacurile dăunătorilor, cum ar fi muștele cerealelor și afidele.

Pe parcursul perioadei, în grâu se vor observa diferite faze – germinare, încolțire (stațiile agrometeorologice: Knezha, Nikolaevo, Kazanlak, Plovdiv, Haskovo, Yambol) și formarea primei–a doua și a treia frunze (Novachene). Diferențele în starea fenologică a culturilor de cereale de toamnă sunt consecința secetei prelungite de toamnă și a semănării întârziate.

Pe parcursul perioadei, condițiile vor fi potrivite pentru plantarea pomilor fructiferi și pentru efectuarea activităților fitosanitare în culturile pomicole.

Sursa: NIMH