

La începutul lunii decembrie, precipitațiile preconizate vor crește rezervele de umiditate din straturile superioare ale solului.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.12.2024 Брой: 12/2024



În următoarea perioadă de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare substanțială. În Bulgaria de Vest este prevăzută o scădere semnificativă a temperaturilor, dar fără valori minime critice pentru culturile de toamnă care sunt în urmă în dezvoltarea lor. Răcirea de la începutul lunii decembrie va duce la o încetinire, iar în câmpurile mai înalte, unde se așteaptă formarea unei pături de zăpadă, la o încetare a proceselor vegetației la culturile de cereale de toamnă.

În majoritatea regiunilor estice și sudice, temperaturile medii zilnice prevăzute vor fi aproape de minimul biologic necesar pentru dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă. Condiții pentru vegetație la culturile de toamnă se vor dezvolta în regiunile de-a lungul litoralului Mării Negre, unde sunt prevăzute temperaturi mai ridicate.

Precipitațiile așteptate în perioadă vor spori rezervele de umiditate a solului din straturile superioare. Aceste precipitații vor veni cu întârziere pentru o parte din culturi în unele locuri din regiunile centrale și sudice, unde, din cauza unui deficit de umiditate a solului, cerealelor de toamnă germinate nu au reușit să răsară. Ca urmare a secetei prelungite de toamnă, o mare parte a culturilor de cereale de toamnă sunt slab instalate, într-o etapă inițială de dezvoltare, iar suprafețele au o densitate neuniformă. La începutul lunii decembrie, la grâu se vor observa următoarele faze: răsărire, 1–2 și 3 frunze. O mică parte a suprafețelor din regiunile nord-estice, unde umiditatea în prima jumătate a toamnei nu a fost un factor limitativ, se află în faza de încolțire (regiunea Provadia) – faza adecvată pentru trecerea iernii.

În perioada respectivă, în regiunile estice ale țării vor apărea condiții mai potrivite pentru plantarea pomilor fructiferi.

Sursa NIMH