

În livadă în decembrie

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.12.2024 *Брой:* 12/2024



La începutul lunii decembrie se prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor. Excepții se vor înregistra de-a lungul litoralului Mării Negre, unde se așteaptă temperaturi mai ridicate.

Spre sfârșitul primei și pe parcursul majorității zilelor din a doua și a treia decadă, temperaturile prognozate vor fi apropiate de normele climatice. Pe parcursul lunii se așteaptă temperaturi minime până la minus 10°C.

Precipitațiile așteptate în decembrie, în jurul normei lunare, vor spori rezervele de umiditate a solului în straturile de 50 și 100 cm. În a treia decadă a lunii noiembrie, nivelul rezervelor de umiditate a solului în majoritatea țării a fost neobișnuit de scăzut pentru sezon. În unele locuri din Câmpia Traciei (Plovdiv, Pazardjik, Chirpan), unde

precipitațiile din noiembrie au fost sărace, umiditatea productivă a fost absentă în întreg stratul de un metru de sol.

Măsuri agrotehnice

În livezi

Lucrările de plantare a pomilor noi și completare a golurilor lăsate de exemplarele care nu au prins în livezile tinere pot continua până la prima înghețare mai persistentă a solului.

Continuă lucrările de împrejmuire a livezilor cu plasă.

În livezile nou înființate se montează structuri de spalier din sârmă, folosind stâlpi de beton cu lungimea de 2,5 m și secțiunea de 8/8 cm. Aceștia sunt bătuți la o adâncime de 50 cm. Stâlpii de capăt sunt consolidați cu contrasuporturi, iar distanța dintre stâlpi pe rând este de 15–20 m.

Continuă lucrările de tăiere a livezilor de măr și păr.

În depozitele de fructe se monitorizează respectarea regimului de păstrare.

Semințele sunt stratificate.

În plantațiile de căpșuni

Atunci când există risc de ridicare a plantelor nou plantate și tinere, solul din jurul acestora este compactat.



Plantele de căpșun sunt plantate în sere încălzite.

Se verifică starea materialului săditor de căpșun depozitat în camere frigorifice pentru plantarea de primăvară-vară.

În plantațiile de zmeur



În caz de ridicare, plantele sunt compactate la timp. Pentru a preveni înghețul apei stagnante, se efectuează drenaj. Se instalează noi structuri de spalier din sârmă și se repară cele vechi. Se repară materialele de ambalare și echipamentele.

Măsuri de protecție a plantelor

În livezi

Având în vedere necesitatea stropirilor de iarnă, toate livezile sunt inspectate pentru a determina densitatea populației de boli și dăunători importanți din punct de vedere economic. Pentru determinarea densității acarienilor se examinează 40 de lăstari cu lungimea de 8–10 cm, colectați de la 10 pomi, și 5 bucăți de scoarță veche cu dimensiunea de $\frac{1}{2} \text{ cm}^2$ pentru fiecare 10 decare de livadă. Lăstarii colectați sunt examinați la binoclu. În același mod se determină stocul de iernare al altor dăunători (ouăle de iernare ale afidelor, larvele de păduche de San Jose și de prun, etc.).

Continuă eradicția gazdelor alternative ale bolilor și dăunătorilor, precum și a pomilor puternic infestați cu gândaci de scoarță sau infectați cu viruși (șarca prunului, lemnul cauciucat al mărului) și boli fungice (frunza argintie).



Continuă stropirea de iarnă a livezilor de cireș, piersic, cais și migdal cu amestec Bordeaux 2% pentru combaterea găuririi frunzelor.

Se achiziționează produse de protecție a plantelor, piese de schimb, pulverizatoare și aparate de prăfuit, plasă, carton ondulat, cherestea și alte materiale necesare măsurilor de protecție a plantelor.