

Decembrie – temperaturi apropiate de normele climatice și precipitații de semnificație agricolă

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2024 Брой: 12/2024



La începutul lunii decembrie este prevăzută o scădere substanțială a temperaturilor, ceea ce va duce la încetinirea și încetarea vegetației la culturile semănate toamna, în majoritatea regiunilor arabile ale țării.

În Bulgaria de Est, unde valorile maxime vor atinge 15-16°C, se vor crea condiții pentru o activare pe termen scurt a vegetației la culturile semănate toamna, însă nu se așteaptă o schimbare semnificativă a stării fenologice a culturilor de cereale de toamnă.

La începutul lunii, ca urmare a secetei prelungite din toamnă, o mare parte a culturilor de grâu își vor înceta vegetația subdezvoltate, într-o fază inițială de creștere. La culturile de cereale de toamnă predomină fazele de

încolțire și formare inițială a frunzelor (1-2 frunze), ceea ce ridică îndoieli cu privire la iernarea lor cu succes. O mică parte a culturilor din regiunile de nord-est (Targoviște, Silistra, Provadia), unde umiditatea din prima jumătate a toamnei nu a fost un factor limitativ, se află în faza a treia frunză și la începutul încălțului (regiunea Provadia) – faza adecvată pentru iernare.

Până la sfârșitul primei și în majoritatea zilelor celei de-a doua și a treia decadă, temperaturile prevăzute, apropiate de normele climatice, vor menține culturile agricole de iarnă în stare de repaus. Pe parcursul lunii, sunt prevăzute temperaturi minime până la minus 10°C care, în absența stratului de zăpadă și cu o persistență mai îndelungată, vor fi critice pentru culturile de cereale de toamnă subdezvoltate, aflate în fazele de încolțire și formare inițială a frunzelor.

Precipitațiile așteptate în decembrie, în jurul normei lunare, vor spori rezervele de umiditate a solului în straturile de sol de 50 și 100 cm.

Precipitațiile căzute la începutul lunii decembrie au depășit 30-40l/m² în multe locuri din Bulgaria Centrală și de Sud (Loveci - 33l/m², Blagoevgrad - 41l/m², Sandanski - 42l/m², Plovdiv - 42l/m², Haskovo - 41l/m², Kardjali - 50l/m², Șirpan - 39l/m²), ceea ce a dus la depășirea deficitului de umiditate pentru culturile semănate toamna în straturile superioare ale solului. În perioada următoare, se așteaptă precipitații agricol semnificative suplimentare, precum și o creștere a nivelului rezervelor de umiditate a solului în straturile de sol de 50cm și 100cm.

Sursa: INMH