

La începutul lunii februarie, culturile de toamnă sunt în stare bună.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2025 Брой: 2/2025*



Temperaturile neobișnuit de ridicate din ultima săptămână a lunii ianuarie, atingând 17-18°C în multe părți ale țării, iar în anumite regiuni din nordul Bulgariei – până la și peste 20°C (Vrața - 22°C, Pleven - 22°C, Loveci - 22°C, Veliko Tărnovo - 23°C, Silistra - 20°C), au condus la reluarea proceselor vegetative la culturile semănate toamna, pe o parte din suprafețele de câmp ale țării. Temperaturile peste normal din ianuarie au întrerupt, de asemenea, perioada de repaus la unele specii de pomi.

Culturile semănate toamna din Dobrogea se află într-o stare generală bună, raportează prof. dr. Ivan Kiryakov, Șeful Departamentului „Ameliorarea plantelor de cereale și leguminoase pentru boabe” de la Institutul Agricol Dobrogea – General Toșevo. Grâul, în funcție de data semănării, se află în diferite stadii de dezvoltare - unele

culturi ies din încălțire, altele se află la începutul fazei. Sfatul său este să se amâne fertilizarea pentru a doua jumătate a lunii februarie.

Culturile din sudul Bulgariei se dezvoltă, de asemenea, normal și se află în stadiul de încălțire. Nu s-a observat nicio daună cauzată de boli, dăunători sau de îngheț la grâu, a împărtășit cu noi conf. dr. Evgheni Dimitrov de la Institutul de Resurse Genetice Vegetale „K. Malkov” din Sadovo. Acolo, fertilizarea de întreținere cu azot la grâu începe de obicei la începutul lunii februarie.

Un factor limitativ pentru dezvoltarea culturilor în întreaga țară este umiditatea din stratul de sol, care în condițiile regiunilor sudice ale țării din ultimii ani a fost caracterizată prin niveluri foarte scăzute, mult sub normă.

După vremea neobișnuit de caldă, până la sfârșitul săptămânii condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare, care va fi substanțială în a doua jumătate a perioadei. Răcirea așteptată va opri vegetația prematură a culturilor de cereale de toamnă și va frâna dezvoltarea nedorită inițială a pomilor fructiferi.

Pe parcursul perioadei, nu sunt prevăzute temperaturi minime critice pentru culturile agricole care iernează.

Condiții mai potrivite pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a solului și tăierea în livezi și vii vor apărea la începutul perioadei.

foto© bluedesign - Fotolia.com

Sursa: INMH și Agri.bg