

La începutul lunii martie, precipitațiile sub formă de ploaie și zăpadă vor crește nivelul rezervelor de umiditate a solului.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 02.03.2025 Брой: 3/2025



Temperaturile minime scăzute înregistrate în ultima perioadă de șapte zile, în unele locuri din nord-vestul Bulgariei și în câmpiile din văile înalte până la și sub minus 13-14°C în Vidin, Kneja, Dragoman și Kazanlak, au pus la încercare rezistența la frig a culturilor de toamnă subdezvoltate, în condiții fără strat de zăpadă. Valorile de acest ordin, atunci când se mențin pentru o perioadă mai lungă, sunt critice pentru culturile de cereale de iernă care hibernează, aflate în faza de 2-3 frunze.

În regiunile nord-vestice, sunt iminente inspecții de teren ale culturilor la stațiile agrometeorologice Băzovec, Kneja, Kyustendil și Kazanlak pentru posibilele daune cauzate de îngheț.

Temperaturile extrem de scăzute din ultima săptămână a lunii februarie au avut un efect devastator asupra livezilor din regiunea Ruse–Silistra. În unele locuri, temperaturile au scăzut până la minus 24 de grade, drept urmare o mare parte din mugurii fructiferi ai merelor s-au înghețat, relatează Nikolay Kolev – Președintele Uniunii Pomicultorilor Dunăreni – Ruse. Daune cauzate de îngheț se observă și la cireș, piersic, prun, măr și pară.

La sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, temperaturile vor fi sub normele climatice, ceea ce va menține starea de repaus la culturile semănate toamna. Valorile minime prognozate sunt peste pragurile critice pentru culturile agricole care hibernează.

Precipitațiile așteptate de ploaie și zăpadă vor crește nivelul rezervelor de umiditate a solului din stratul de 50 cm. Ca urmare a precipitațiilor sub normale din ianuarie și prima jumătate a lunii februarie, rezervele de umiditate a solului din stratul de 100 cm în majoritatea țării sunt nesatisfăcătoare pentru această perioadă a anului. La sfârșitul săptămânii viitoare se prognozează o probabilitate crescută de formare a stratului de zăpadă și de îmbunătățire a condițiilor de hibernare pentru culturile semănate toamna.

Sursa: INMH