

În martie, temperaturile vor fi în jurul și peste normele climatice, iar precipitațiile în jurul și sub norme.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 09.03.2025 Брой: 3/2025



În prima jumătate a primei decadă, temperaturile prognozate se vor încadra în intervale care vor limita dezvoltarea culturilor agricole.

În a doua jumătate a decadei, se așteaptă o creștere substanțială a temperaturilor, iar valorile lor medii zilnice vor atinge și vor depăși minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă.

Temperaturile prognozate peste normal în a doua decadă a lunii martie vor stimula vegetația culturilor semănate toamna. În această perioadă, o parte din culturile de grâu și orz aflate în prezent în faza de trei frunze vor intra în faza de încălțare.

Temperaturile maxime așteptate, până la și peste 20°C, vor activa, de asemenea, procesele vegetative la o mare parte din culturile perene. La culturile pomicele, etapele de umflare a mugurilor și de deschidere a mugurilor vor progresa la speciile cu înflorire timpurie (migdal, cais, piersic). În livezile din câmp, se va observa curgerea sevei.

Condițiile din perioadă vor fi favorabile pentru fertilizarea de susținere a culturilor de toamnă cu îngrășăminte azotate minerale, pentru efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănat și pentru semănatul culturilor de primăvară timpurii (mazăre, mazăre pentru boabe, orz de primăvară).

La începutul celei de-a doua decade a lunii martie, nu se așteaptă precipitații, ceea ce va oferi o oportunitate pentru aplicarea la timp a tratamentelor preventive pre-inflorire în livezi cu fungicide pe bază de cupru împotriva agenților cauzatori ai arsurii florilor, buboiului piersicului, tăiei și a altor patogeni.

În a treia decadă, temperaturile așteptate, în jurul și peste normele climatice, vor menține active procesele vegetative la culturile agricole. La sfârșitul lunii, la culturile de cereale de toamnă care s-au încălțat toamna, se va observa o creștere a coeficientului de încălțare.

În martie, la culturile pomicele, vor progresa etapele de umflare și deschidere a mugurilor. La sfârșitul lunii, la speciile cu înflorire timpurie – migdal, cais și piersic – se va observa faza de mugur floral, iar în unele localități din regiunile sudice – începutul înfloririi. În livezile din câmp, se va observa curgerea sevei.

Pe parcursul lunii, temperaturile minime prognozate, până la minus 7°C, vor prezenta un risc pentru culturile pomicele aflate în faza de mugur și înflorire.

Precipitațiile din martie vor spori rezervele de umiditate a solului din stratul de 100 cm. La sfârșitul lunii februarie, în majoritatea țării, cu excepția unor locuri din regiunile estice, nivelul rezervelor de umiditate a solului pentru culturile de cereale de toamnă în stratul de un metru este scăzut pentru sezon – în unele părți ale Câmpiei Dunării și ale regiunilor sudice sub 70% din capacitatea de câmp (CC). De obicei, la sfârșitul iernii, în anii fără anomalii climatice, rezervele de umiditate a solului în stratul de un metru ating niveluri până la CC.

În martie, condiții mai favorabile pentru efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănat a suprafețelor destinate semănatului cu culturi de primăvară timpurii și medii-timpurii vor apărea în a doua jumătate a lunii. La mijlocul

lunii martie, începe perioada agrotehnică (15-20.03) pentru semănatul floarea-soarelui în sudul Bulgariei, iar la mijlocul celei de-a treia decade (25.03–5.04) – în Câmpia Dunării.

Sursa: INMH