

Априлие – vreme instabilă și precipitații de semnificație agricolă

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.04.2025 *Брой:* 4/2025



În aprilie, condițiile agrometeorologice se vor caracteriza prin dinamică crescută. În majoritatea zilelor lunii, acestea vor fi determinate de vreme instabilă. Precipitațiile preconizate, în jurul și peste normele climatice, vor menține rezerve bune de umiditate a solului în stratul de 50 cm și condițiile pentru vegetația cerealelor de toamnă și a culturilor primăvăratice semănate. Aceasta este afirmată în prognoza lunară a agrometeorologilor de la INMH.

În prima jumătate a lunii aprilie, vegetația culturilor agricole va decurge la temperaturi medii zilnice în jurul și sub normele climatice. În prima decadă, grâul din suprafețele de câmp va intra în faza de înălțare a tulpinii.

În a doua decadă, sunt prevăzute temperaturi minime negative până la minus 2-3°C, cu un risc crescut de deteriorare a înfloriturilor și a fructelor tinere la pomii fructiferi. Ultimele înghețuri de primăvară sunt așteptate la sfârșitul decadei, ceea ce trebuie luat în considerare la întărirea răsadurilor de legume.

Bolile Septoria la grâul de toamnă

O creștere a temperaturilor medii zilnice și o accelerare a ritmurilor de dezvoltare ale culturilor agricole este prevăzută la sfârșitul celei de-a doua și în a treia decadă. În această perioadă, grâul va trece de la faza de înălțare a tulpinii la înflorire și faza de înflorire. Perioada inter-fază înălțare tulpină – înflorire este critică pentru infectarea cerealelor de toamnă cu patarea foliară Septoria.



Suprafețele cu grâu trebuie de asemenea monitorizate pentru prezența dăunătorilor – gândacul frunzelor de cereale, ploșnița cerealelor și, la densități peste pragul economic de dăunare, este necesar un tratament oportun.



Tăciunea mărului

Precipitațiile frecvente pe parcursul lunii vor crea condiții pentru creșterea fondului de infecție al unei serii de boli fungice la culturile pomicole – arsura florilor (putregaiul brun timpuriu), tăciunea, găurirea frunzelor, bula de piersic etc. În prima jumătate a celei de-a treia decade, este prevăzută o probabilitate crescută de furtuni cu grindină. Pomii fructiferi afectați de grindină trebuie tratați cu fungicide care conțin cupru la prima oportunitate, pentru a limita riscul de infecții secundare cu patogeni.

În aprilie, condiții mai potrivite pentru efectuarea tratamentelor de protecție a plantelor vor apărea la începutul și sfârșitul celei de-a doua decade și în a doua jumătate a celei de-a treia decade.

La începutul celei de-a treia decade, temperatura solului în stratul de 10 cm va atinge valori potrivite pentru semănatul porumbului, iar la sfârșitul lunii aprilie – și pentru culturile primăvăratice termofile (bumbac, fasole, arahide, pepeni, pepeni galbeni etc.).