

În a doua decadă a lunii aprilie, se prognozează o creștere a temperaturilor și o îmbunătățire a condițiilor pentru dezvoltarea culturilor agricole.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 11.04.2025 Брой: 4/2025



Vremea neobișnuit de rece din perioada trecută, cu temperaturi minime sub zero și ninsoare, a provocat daune ireparabile pomilor fructiferi și culturilor de rapiță care intraseră în faza de înflorire, conform agrometeorologilor. Agronomii sunt pe cale să efectueze inspecții la ferme pentru a determina pagubele la speciile fructifere și la alte culturi agricole.

Prima undă de frig de la începutul lunii a afectat serios producătorii de caise din regiunea Silistra. În ciuda daunelor provocate de condițiile de iarnă din țară, soiul „Silistrenska Kompotna” și-a păstrat florile și se așteaptă

să dea roade.

Caisa „Silistrenska Kompotna” este un soi standard principal creat la stația experimentală din orașul Silistra în 1964 prin încrucișarea unei caise maghiare cu soiul Krasnoshchekiy. Pomul are o vigoare moderată, cu o coroană globulară. Înflorirea este mijlocie-târzie; este un soi autofertil.

În următoarea perioadă de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare substanțială. La începutul celei de-a doua decadă a lunii aprilie, se prognozează o creștere a temperaturilor și o îmbunătățire a condițiilor pentru dezvoltarea culturilor agricole.

În majoritatea zilelor perioadei, vegetația culturilor de cereale de toamnă va decurge într-un ritm moderat, la temperaturi medii zilnice apropiate de normele climatice pentru a doua decadă a lunii aprilie.

Precipitațiile răspândite din prima decadă, care în unele zone de câmp au depășit 40 - 50 l/m², iar local în sudul Bulgariei au atins normele pentru aprilie (Plovdiv - 57 l/m², Haskovo – 58 l/m², Kardzhali – 57 l/m², Chirpan – 56 l/m²), au îmbunătățit brusc rezervele de umiditate a solului, lucru de o importanță majoră pentru desfășurarea normală a proceselor vegetative la cerealele de toamnă și culturilor de primăvară semănate.

La sfârșitul perioadei, în cea mai mare parte a suprafețelor cu grâu se va observa faza de înălțare a tulpinii, în timpul căreia plantele își cresc cerințele pentru umiditatea solului. La culturile de floarea-soarelui semănate la începutul primăverii, va predomina faza de răsărire.

Precipitațiile așteptate în perioadă vor menține un conținut ridicat de umiditate în straturile superioare ale solului, ceea ce va întârzia semănatul florii-soarelui dincolo de termenele agrotehnice recomandate.

În a doua decadă a lunii aprilie, culturile de cereale de toamnă trebuie monitorizate pentru prezența bolilor și dăunătorilor: făinarea, septorioza, gândacul frunzelor de cereale, tripsul grâului, ploșnița cerealelor etc., iar dacă numărul acestora depășește pragul economic de dăunare, este necesar un tratament la timp.