

Control rapid al buruienilor pentru randamente ridicate la floarea-soarelui

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 16.04.2025 Брой: 4/2025



Erbicidele FMC Agro Bulgaria – Express® 50 SG și Evorelle® Express® – asigură protecție selectivă și câmpuri curate în primele faze de creștere ale florii-soarelui.

Erbicidele Express® 50 SG și Evorelle® Express® sunt destinate combaterii selective a buruienilor dicotiledonate la **hibrizii de floarea-soarelui toleranți la Express® și Evorelle® Express®**. Este extrem de important ca erbicidele să fie **aplicate doar pe hibrizi toleranți**, lista acestora fiind disponibilă pe site-ul FMC. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați reprezentanții de vânzări FMC.

Express® 50 SG și Evorelle® Express® sunt singurele erbicide înregistrate pentru utilizare într-un număr mare de hibrizi de floarea-soarelui toleranți la Express® 50 SG / Evorelle® Express®.

Express® 50 SG – eficacitate dovedită împotriva principalelor buruieni dicotiledonate la floarea-soarelui

Express® 50 SG este un erbicid sistemic de post-emergență care asigură controlul fiabil al celor mai răspândite și greu de combătut buruieni dicotiledonate la floarea-soarelui, precum **pălămida, volbura, roșcov, ciuma-ciumei, steluța, știrul** și altele. Creșterea buruienilor se oprește la doar câteva ore după tratament, iar moartea completă a buruienilor are loc în 15-25 de zile.

Pentru a asigura eficacitatea deplină a produsului, adjuvantul Trend® 90 trebuie adăugat în soluția de stropit. Nu este recomandat tratarea plantelor stresate.

Evorelle® Express® – o soluție nouă pentru provocări serioase

Evorelle® Express® este un erbicid cu acțiune combinată, destinat controlului eficient al buruienilor dicotiledonate rezistente la floarea-soarelui. Evorelle® Express® este deosebit de potrivit în condițiile în care există răspândire a buruienilor greu de controlat, cum ar fi **cânepa-câinelui, pălămida, ciuma-ciumei, steluța, iarba lui Johnson** și diverse **specii de știr**. Produsul pătrunde rapid în țesuturile buruienilor, blocând procesele enzimatice asociate cu creșterea. Simptomele vizibile apar în zece zile de la tratament, iar moartea speciilor sensibile are loc în 15–25 de zile.

Controlul buruienilor creează un mediu favorabil, dar creșterea necesită și o nutriție echilibrată. Îngrășămintele foliare și biostimulatorii FMC – **Rhizomagic, Seamac™ OR, Nuvola™ AMIN** și **BO-LA™** – aprovizionează plantele cu nutrienții necesari, aminoacizii și compușii bioactivi care susțin creșterea, sporesc toleranța și compensează condițiile de stres. Unele dintre ele, inclusiv Rhizomagic, Seamac™ OR și Nuvola™ AMIN, sunt incluse în lista Agenției Bulgare pentru Siguranța Alimentelor (BFSA) a îngrășămintelor organice și organo-minerale înregistrate și sunt **adecvate pentru utilizare în schemele eco**.