

La sfârșitul lunii aprilie – vreme instabilă cu precipitații și condiții pentru formarea înghețului.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.04.2025 Брой: 4/2025



La sfârșitul lunii aprilie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de vreme instabilă și temperaturi apropiate de normele climatice pentru a treia decadă a lunii aprilie. Precipitațiile de la sfârșitul perioadei trecute în multe locuri din regiunile vestice au sporit rezervele de umiditate din straturile superioare ale solului. În primele zile ale perioadei, se prognozează precipitații și o îmbunătățire a condițiilor pentru vegetația culturilor agricole și în regiunile estice ale țării.

Dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă și a culturilor de primăvară semănate în a doua jumătate a perioadei va decurge în condiții termice sub normale. La sfârșitul lunii aprilie, stadiul de încovoiere a tulpinii va predomina masiv la grâu. La începutul lunii mai, la orz, în unele locuri din regiunile de câmp, se va observa și

începutul înspicării. În culturile semănate de floarea-soarelui și porumb, în funcție de datele de semănat, vor avea loc emergența și formarea inițială a frunzelor.

Dăunători la porumb



Gândacul gri al porumbului (Tanymecus dilaticollis Gyll.)

În stadiile inițiale de vegetație ale porumbului și floarea-soarelui, culturile trebuie monitorizate pentru prezența unui dăunător periculos – gândacul gri al porumbului. Când densitatea dăunătorului depășește Pragul Economic de Dăunare (PED), culturile trebuie tratate la prima ocazie cu unul dintre insecticidele omologate (PED la stadiul de emergență: floarea-soarelui – 2 gândaci pe m²; porumb > 2 gândaci pe m²).



Mana viței de vie (Plasmopara viticola)

La viță-de-vie, va avea loc formarea celei de-a 2-a—3-a frunze, iar în regiunile extreme sudice, apariția inflorescențelor. În această perioadă, este recomandabil să se efectueze tratamente preventive ale viței-de-vie împotriva agenților cauzatori ai manei și a făinării.

Practici de protecție a plantelor la culturile legumicole în aprilie

La sfârșitul lunii aprilie, se prognozează o scădere substanțială a temperaturilor minime și condiții pentru formarea înghețului, ceea ce trebuie luat în considerare la plantarea răsadurilor de legume în grădini.