

În ultima săptămână a lunii mai, dezvoltarea culturilor agricole va avea loc la temperaturi sub normele climatice și precipitații gospodărești.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 26.05.2025 Брой: 5/2025



În următoarea perioadă de șapte zile, condițiile agrometeorologice vor continua să fie determinate de vreme instabilă. În cursul perioadei sunt prevăzute precipitații de semnificație agronomică, precum și o îmbunătățire a rezervelor de umiditate a solului, chiar și în straturile mai adânci.

Precipitațiile din primele două decenii ale lunii mai au fost distribuite neuniform. În multe locuri din sudul Bulgariei, precipitațiile din mai au atins și au depășit normele lunare (Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali, Elhovo, Chirpan, Karnobat, Burgas). În o parte din regiunile sudice, rezervele de umiditate a solului în straturile de 50 și

100 cm au atins niveluri de până la și peste 85% din capacitatea de câmp (CC), optimă pentru dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă și a culturilor primăvăratice semănate.

Spre deosebire de regiunile sudice, în unele locuri din nord-estul Bulgariei (stația agrometeorologică Silistra), ca urmare a precipitațiilor sub normale din aprilie și din prima jumătate a lunii mai, nivelul rezervelor de umiditate a solului pentru culturile de cereale de toamnă la sfârșitul celui de-al doilea deceniu este scăzut – sub 65% din CC.

În ultima săptămână a lunii mai se așteaptă o îmbunătățire substanțială a rezervelor de umiditate a solului în regiunile de nord-est, lucru de mare importanță pentru culturile de cereale de toamnă, care au cerințe ridicate de umiditate a solului.

În cursul perioadei, dezvoltarea culturilor agricole va progresa la temperaturi sub normele climatice. Până la sfârșitul lunii mai, la culturile de cereale de toamnă va avea loc formarea și umplerea bobului.



În această perioadă inter-fazică, pagube la grâu sunt cauzate de larvele ploșniței cerealelor, ceea ce necesită inspecția în câmp a culturilor, iar atunci când densitatea dăunătorilor depășește pragul economic de dăunare (2 larve/m²), tratamentul trebuie efectuat la prima oportunitate.

La floarea-soarelui și porumb, va avea loc formarea frunzelor.

La sfârșitul lunii mai, în viță-de-vie va predomina înflorirea inflorescențelor, o etapă critică pentru infecția cu mană și mucegaiul cenușiu.

În ultima săptămână a lunii mai, conținutul crescut de umiditate din straturile superioare ale solului va restricționa executarea lucrărilor sezoniere de lucrare a solului. În perioadă se așteaptă grindină. Pentru pomii fructiferi, culturile legumicole și viile afectate de grindină, este recomandabil să se efectueze tratamente cu fungicide care conțin cupru pentru a reduce riscul de infecții secundare cu patogeni.

Sursa: NIMH