

Activități Agrotehnice în Livadă în Iunie

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.06.2025 *Брой:* 6/2025



Pentru majoritatea zilelor din iunie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normele climatice și de precipitații în jurul și sub norma lunară. Temperatura medie lunară pentru cea mai mare parte a țării va fi între 25 și 26 °C, cu temperaturi tradițional puțin mai ridicate în valea râului Struma - în jur de 27 °C, și în zonele Ruse și Vidin – 26-27 °C. Cele mai scăzute temperaturi din timpul lunii vor fi între 12 °C și 15 °C, iar cele mai ridicate - între 32 °C și 35 °C, cu valori de până la 37 °C posibile în anumite regiuni.

În ceea ce privește precipitațiile, în acest an luna este așteptată să fie similară cu mai. Cantitățile normale de precipitații în zonele joase variază între 40 și 90 l/mp, în zona Pre-Balcanică și munți - între 95 și 100 l. Spre sfârșitul lunii, seceta este adesea observată, dar în acest an perioada uscată va fi în prima decadă a lunii.

La începutul lunii iunie, se prevede o creștere semnificativă a temperaturilor și o accelerare a ritmurilor de dezvoltare a culturilor agricole. Precipitațiile așteptate în a doua jumătate a primei decade vor menține un nivel bun al rezervelor de umiditate în straturile de sol de 50 cm și 100 cm. Ploile semnificative de la sfârșitul lunii mai au îmbunătățit rezervele de umiditate din sol, iar în majoritatea zonelor agricole, acestea au atins niveluri de până la și peste 85% din capacitatea de câmp.

Vremea însorită va predomina în țară, dar până la prânz; după-amiezele vor aduce precipitații și furtuni, local, în special peste munți. În multe locuri din vestul Bulgariei și din regiunile muntoase, sunt posibile ploi de scurtă durată, însoțite de activitate de furtună în orele după-amiezii. Probabilitatea de precipitații este mai mică în regiunile estice și în câmpii. Temperaturile în țară vor fi între 28-32 °C. O masă de aer relativ mai caldă va fi transportată, iar până la mijlocul primei decade, temperaturile vor depăși 32 °C. Ne așteptăm la o creștere semnificativă a temperaturilor în jurul datelor de 5-9 iunie. Atunci, atmosfera va fi instabilă, iar precipitațiile, deși localizate, sunt așteptate. Temperaturile așteptate vor fi între 32-35 °C. Temperaturile ridicate sunt, de asemenea, o condiție prealabilă pentru fenomene extreme, în special în vestul și nord-vestul Bulgariei, aceste fenomene fiind probabil însoțite de grindină mare. O nouă scădere a temperaturilor, deși ușoară, va avea loc spre sfârșitul primei decade.

Condiții termice peste normă sunt prevăzute și pentru a doua decadă a lunii iunie. A doua decadă va începe cu mai multe ore însorite. Vremea, în general, va fi predominant însorită și caldă. Condiții pentru precipitații mai semnificative vor exista în jurul datelor de 13 și 17 iunie. Zilele vor începe cu mai multe ore însorite. În orele după-amiezii, mai ales la munte, se vor dezvolta nori cumulus, și va ploua și va tuna în mai multe locuri. Probabilitatea de precipitații este mai mică în Câmpia Dunării și în estul Bulgariei. Temperaturile diurne vor fi între 32-36 °C, iar în estul Bulgariei ușor mai scăzute – până la 25-30 °C. Spre mijlocul celei de-a doua decade a lunii iunie, atmosfera se va destabiliza, iar precipitațiile vor apărea în mai multe locuri.

În a treia decadă a lunii iunie, dezvoltarea culturilor agricole va avea loc la temperaturi apropiate de normele climatice. În primele zile ale celei de-a treia decade, vremea va fi instabilă, dar va rămâne caldă pentru această perioadă. În multe locuri, se vor dezvolta nori cumulonimbus, iar ploile de scurtă durată cu furtuni vor cădea după-amiaza. În ultimele zile ale lunii, se așteaptă o stabilizare a masei de aer și o creștere a temperaturilor. Până la sfârșitul perioadei, precipitațiile vor scădea, iar temperaturile vor crește. Este așteptată și o perioadă de secetă, cu precipitații observate în mai puține locuri. Valorile diurne vor fi între 32-37 °C.

În pepinierele pomicele

Stratul germinativ este fertilizat cu 6-8 kg de azotat de amoniu sau aceeași cantitate de alt îngrășământ cu azot pe decare și cultivat. Dacă este necesar, se efectuează irigarea.

Plantațiile mamă sunt fertilizate cu 10-15 kg de azotat de amoniu sau aceeași cantitate de alt îngrășământ cu azot pe decare și mușuroite. Dacă este necesar, sunt irigate înainte de mușuroire.

Se efectuează copilitul în pepiniere pentru a facilita creșterea normală a altoiurilor. Portaltoi și pepinierele sunt pregătite pentru altoire în ochi.

În livezile de pomi fructiferi

Se are grijă ca legăturile de pe ramurile pomilor fructiferi re-altoiți și a formelor sălbatice să nu strângă; dacă este necesar, acestea sunt slăbite prompt. Lăstarii concurenți care au crescut din planta mamă ar trebui îndepărtați la timp. Pomi tineri proaspăt plantați sunt cultivați regulat. Dacă este necesar, sunt udați.

După a doua decadă, plantațiile tinere de pomi fructiferi sunt fertilizate cu 15-20 kg de azotat de amoniu pe decare sau aceeași cantitate de alt îngrășământ cu azot, și se efectuează o cultivare superficială a solului.

La formarea unei palmete, ramurile scheletice sunt îndoite atunci când ating o lungime totală de 2 – 2,5 m pentru primul etaj, 1,5-2 m pentru al doilea și 1 m pentru al treilea. Pentru pomii cu creștere slabă, acestea sunt plasate la un unghi de 45-50⁰, iar pentru cei cu creștere puternică – la 45-45⁰ față de orizontală. Când există ramuri scheletice de lungimi diferite într-un singur etaj, doar cea puternică este îndoită, în timp ce cea slabă este lăsată să crească și este îndoită mai târziu.

Subțierea mecanică a fructelor de piersic continuă.

În zonele cu irigații asigurate, se efectuează semănarea culturilor pentru îngrășământ verde.



Începe recoltarea în masă a cireșelor și vișinelor

În plantațiile de căpșuni

Ultimele răsaduri de căpșuni păstrate în frigider sunt plantate. Îngrijirea pentru plivirea culturilor tinere și nou plantate continuă. Dacă este necesar, se efectuează irigarea.

Recoltarea continuă. Nu se culeg în orele calde ale zilei sau când s-a format roua. Pentru consum proaspăt, se culeg împreună cu caliciul fructului.

În zonele de cultură mai calde, după recoltarea ultimelor fructe, paiele sunt imediat adunate și îndepărtate. Plantațiile sunt fertilizate cu 8-10 kg de azotat de amoniu sau aceeași cantitate de alt îngrășământ cu azot pe decare, și se efectuează prima cultivare post-recoltare. Dacă este necesară irigarea, aceasta se face înainte de fertilizare.

În plantațiile de zmeură

Se efectuează cultivarea regulată a solului și se irigă dacă este necesar. În plantațiile fructifere, continuă curățarea rândurilor de lăstarii foarte slabi și în exces. Structura de sârmă este menținută puternică.



În unele regiuni, recoltarea soiurilor timpurii de fructe începe în jurul mijlocului lunii iunie.

Când începe coacerea, coloniile de albine sunt mutate în alte plantații, dar la o distanță de cel puțin 5 km.

În plantațiile de coacăz negru

Solul din straturile de înrădăcinare este cultivat de 2-3 ori în funcție de irigații, precipitații și prezența buruienilor.

Cultivarea regulată se efectuează atât pentru plantațiile tinere, cât și pentru cele fructifere. În jurul mijlocului lunii, recoltarea fructelor începe în unele zone de cultură mai calde.

În plantațiile cu alte culturi

Continuă altoirea portaltoilor de lămâi pe muguri activi.

Îngrijirea pentru înrădăcinarea butașilor de rodie, smochin și cătină în câmp deschis continuă, pepiniera fiind cultivată și udată regulat. Se efectuează tratamentele necesare împotriva buruienilor.

Spre sfârșitul lunii, portaltoii nealtoiți de anul trecut sunt altoiți în ochi cu muguri activi de kaki.



Legarea vițelor de kiwi de araci auxiliari continuă. Fertilizarea se efectuează cu ultima 1/3 din norma anuală de azot specificată pentru kiwi. Lăstarii laterali de pe tulpina principală a kiwi-ului sunt îndepărtați pentru a-i stimula dezvoltarea și modelarea generală. Acesta este modelat în forma literei T.