

În timpul ultimei decade a lunii iunie, vegetația culturilor de primăvară va decurge sub temperaturi ridicate și deficit de umiditate în sol

Автор(и): Растителна защита

Дата: 24.06.2025 Брой: 6/2025



După temperaturile ridicate de la mijlocul lunii iunie, care au atins și depășit 35-36° în unele regiuni sudice, nu s-au observat modificări ale condițiilor agrometeorologice. Precipitațiile așteptate la începutul perioadei vor fi fără semnificație economică. Din cauza precipitațiilor sub-normale și a temperaturilor peste medie din primele două decade ale lunii iunie, rezervele de umiditate din sol pentru culturile de primăvară au scăzut semnificativ. În unele regiuni sudice, nivelul rezervelor de umiditate din stratul de 50 cm pentru porumb și floarea-soarelui este neobișnuit de scăzut pentru începutul verii - sub 60% din capacitatea de câmp.

În majoritatea zilelor din perioada următoare, vegetația culturilor de primăvară va decurge la temperaturi în jurul și peste normele climatice pentru a treia decadă a lunii iunie, iar în multe regiuni agricole – și cu un deficit de umiditate în sol. Acesta este al treilea an consecutiv cu o secetă severă în lunile de vară, ceea ce este dăunător pentru culturile de porumb și floarea-soarelui.

Pe parcursul perioadei, la floarea-soarelui va avea loc formarea inflorescențelor.



Atacul gărgăriței cenușii a porumbului este deosebit de periculos pentru culturile de primăvară. Oamenii de știință de la Institutul Agricol – Șumen au efectuat un studiu al câmpurilor de porumb și floarea-soarelui din regiunile Veliko Târnovo, Târgoviște, Ruse, Razgrad și Șumen și au constatat pagube semnificative provocate de dăunător.

La porumb va avea loc formarea frunzelor. La sfârșitul lunii iunie, la hibridii timpurii de porumb se va observa începutul fazei de înspicare.

Dăunătorii porumbului

În a treia decadă a lunii iunie, inspecția culturilor de porumb pentru prezența unuia dintre cei mai periculoși dăunători – sfredelitorul porumbului – ar trebui să continue, iar dacă numărul depășește pragul economic (10

ponte la 100 de plante), este necesar un tratament insecticid împotriva larvelor înainte ca acestea să pătrundă în tulpini.

Sfredelitorul European al Porumbului (*Ostrinia nubilalis* Hübner) – un Dăunător Economic Important al Porumbului

Pe parcursul perioadei, la grâu se va observa maturitatea în pârgă și maturitatea deplină în regiunile agricole. Pentru culturile din câmpurile de altitudine, va avea loc maturitatea în lapte și o tranziție către maturitatea în pârgă.

Se prognozează temperaturi maxime ridicate și risc de incendii în timpul recoltării cerealelor.