

Activități agrotehnice în livadă în iulie

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.07.2025 *Брой:* 7/2025



În luna iulie, dezvoltarea culturilor agricole va avea loc la temperaturi peste normele climatice. Se prognozează precipitații sub normale, iar deficitul de umiditate al solului se va adânci, necesitând aplicarea unui regim de irigare adecvat pentru culturile agricole.

Temperaturile maxime ridicate prognozate în iulie, peste 38-40 °C, vor perturba cursul normal al proceselor fiziologice la culturile pomicole.

În prima decadă, se preconizează temperaturi cu 3-5 grade sub norma climatică. Temperaturile în țară se vor situa între 28-32 °C. Probabilitatea precipitațiilor frecvente în mai multe zone ale țării va crește, cu cantități mai mari, furtuni și condiții pentru grindină. Se așteaptă mai multă ploaie în regiunile montane. Probabilitatea

precipitațiilor este mai mică în regiunile estice. Tendința este ca vremea să fie neobișnuit de răcoroasă pentru începutul celei mai călduroase luni a anului.

În a doua decadă a lunii iulie, temperaturile vor crește și vor fi în jurul și peste norma climatică. În primele zile ale celei de-a doua decade, masa de aer de deasupra țării va rămâne instabilă, iar probabilitatea precipitațiilor, a furtunilor și chiar a grindinei va crește. Temperaturile vor urca și se vor situa între 30-35°C.

În a treia decadă a lunii iulie, în cea mai mare parte a țării probabilitatea precipitațiilor va fi mult mai scăzută. Probabilitatea precipitațiilor va fi mai mare deasupra Câmpiei Dunării și a Bulgariei de Sud. Vremea va fi însorită și caniculară. Se așteaptă temperaturi peste 35°C. Spre sfârșitul lunii, va crește și probabilitatea incendiilor bruște.

În pepinierele pomicole

Răsadnițele sunt irigate și lucrate periodic pentru a asigura cel mai mare procent posibil de material portaltoi standard, iar plantațiile-mamă sunt irigate și, dacă este necesar, buturate. Pentru a asigura condiții pentru o bună dezvoltare a pomilor altoiți, în pepinierele de doi ani se efectuează, dacă este necesar, tăieri verzi. Se efectuează lucrări periodice de întreținere și irigare, în special pentru peri.

În pepinierele de un an, începe altoirea portaltoielor, iar cele care nu au prins sunt reînchipuite. La aproximativ două săptămâni după închipuire, se inspectează legăturile. Cele care au tăiat în scoarță sunt slăbite.

În livezile pomicole

Se continuă lucrările de îndoire a ramurilor scheletice la formarea pomilor în palmetă. Prin irigare, se menține umiditatea solului peste 70% din capacitatea de câmp.

Folosind grapa cu discuri, cultivatorul, freza rotativă și freza rotativă cu secțiune decalată, suprafața solului dintre rânduri și pe rând este menținută lucrată și fără buruieni, dacă spațiul dintre plante nu este ierbos.

Se continuă recoltarea cireșelor și vișinelor.



Începe recoltarea în masă a caiselor și piersicilor

În plantațiile de căpșuni

Se continuă îngrijirea prin irigare a plantațiilor nou înființate de căpșuni, în special a celor plantate în iunie.

În regiunile mai joase și mai călduroase, unde recoltarea fructelor s-a încheiat, paiele sunt adunate, îndepărtate și arse.



Recoltarea fructelor continuă în locurile mai înalte și mai răcoroase. După îndepărtarea paielor, plantațiile sunt irigate și lucrate, după fertilizarea prealabilă cu 10-12 kg de azotat de amoniu pe decar.

Plantațiile-mamă destinate producerii de saduri sunt irigate, fertilizate cu 15-20 kg de azotat de amoniu pe decar și săpate. Paliții din plantațiile din care nu se ia material de plantare sunt tăiați.

Se stabilesc și pregătesc noi suprafețe pentru plantații de căpșuni pentru plantarea de toamnă în câmp deschis. Înainte de lucrarea profundă a solului, suprafața este fertilizată cu 2-4 t de gunoi de grajd, 60-80 kg de superfosfat și 20-30 kg de sulfat de potasiu pe decar.

În plantațiile de zmeur

Se continuă îngrijirea prin irigare și lucrarea solului la noile plantații. Plantațiile în rod sunt irigate și lucrate. Norma de irigare este de 50-60 dm³ pe decar.



Se efectuează recoltarea în masă a fructelor.

Se îngrijesc plantațiile-mamă de zmeur – irigare și lucrarea solului, pentru a asigura cantitatea maximă de material de plantare – odrasle. Plantațiile sunt inspectate, se îndepărtează plantele atipice de alte soiuri, iar lăstarii vechi, care au dat rod, sunt tăiați, adunați și arși.

În plantațiile de coacăz negru

Se continuă îngrijirea solului din buturări. Solul este irigat și lucrat. În plantațiile tinere și în rod nu se permite infestarea cu buruieni. Plantațiile sunt fertilizate cu îngrășământ azotat (1/3 din norma anuală).

Se efectuează recoltarea în masă a fructelor. În timpul recoltării, plantele atipice de alte soiuri sunt marcate pentru a fi scoase ulterior, precum și plantele bolnave și slabe. După recoltare, se îndepărtează lăstarii spărți, subdezvoltați și în exces.

În plantațiile cu alte culturi

Sunt marcate soiurile și formele de smochin dorite pentru obținerea de butași.

Se obțin butași de actinidie (kiwi), dafin, aronia, cătină și rodie pentru înrădăcinare într-o seră cu ceață artificială.

Butașii sunt pregătiți. Butașii sunt tratați cu o soluție de acid indolilbutiric timp de 5 secunde. Aceștia sunt înrădăcinați în sere cu ceață artificială într-un substrat format din două părți perlite și o parte turbă.

Începe altoirea portaltoielor de curmal caucazian cu curmal japonez și a puieților de actinidie cu soiuri cultivate.

Se continuă legarea vițelor de actinidie de spalierul din sârmă. Se efectuează tăierile de vară ale actinidiei.

Giușerul și fisticul sunt închipuiți.



Se recoltează fructele de smochin

Cătina – o cultură pomicolă puțin cunoscută, dar promițătoare

Spre sfârșitul lunii, începe recoltarea fructelor de cătină și aronie.