


Factorul limitativ pentru dezvoltarea culturilor agricole târzii în luna august rămâne deficitul de umiditate a solului.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.08.2025 *Брой:* 8/2025



În luna august, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normele climatice și precipitații – în jurul și sub norma lunară. Deficiența de umiditate a solului va rămâne un factor limitativ pentru dezvoltarea culturilor agricole târzii și în august.

Precipitațiile căzute la sfârșitul lunii iulie, în urma secetei adâncite, au fost locale și insuficiente pentru a depăși deficitul de umiditate la culturile agricole târzii. În majoritatea regiunilor de câmp, umiditatea productivă este absentă în straturile de sol de 50 și 100 cm.

În majoritatea zilelor din august, vremea relativ uscată prognozată va impune aplicarea unor norme sporite de irigare pentru culturile secundare și pentru hibrizii târzii de porumb. Norme sporite de irigare vor fi necesare și pentru pomii fructiferi, care se află în proces de formare a mugurilor floralii pentru anul următor.

Noua generație de hibrizi de floarea-soarelui de la IAD este un format de intensitate ridicată pentru managementul producției

În august, mai devreme decât termenele obișnuite pentru țară, se va finaliza dezvoltarea culturilor de primăvară târzii. La începutul lunii august, în culturile de floarea-soarelui din sudul Bulgariei se va observa maturitatea tehnică (Plovdiv, Haskovo, Sliven, Iambol), iar la sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decadă - de asemenea, în culturile din cea mai mare parte a regiunilor de câmp. Hibrizii mai timpurii de porumb cultivați în condiții irigate vor intra în maturitatea de ceară și completă în prima decadă. Hibrizii mediu-târzii își vor finaliza dezvoltarea în a treia decadă a lunii august.

Datorită condițiilor agrometeorologice nefavorabile din prima jumătate a verii, cu secetă prelungită și temperaturi extrem de ridicate, se așteaptă producții scăzute la porumb și floarea-soarelui.

Temperaturile persistent ridicate din iulie, care vor continua în august, amenință serios recolta culturilor de primăvară.

Singurul centru de ameliorare a florii-soarelui din țară este Institutul Agricol Dobrogea, unde eforturile de ameliorare sunt concentrate pe crearea de noi soiuri de floarea-soarelui rezistente la lupoaie, la mană și la secetă. Unul dintre noii hibrizi ai Institutului – „Dara”, potrivit pentru cultivare folosind tehnologia „Express” și rezistent la mană până la rasa 731 și la lupoaie până la rasa G, se comportă foarte bine în condiții de secetă și temperaturi ridicate.

În august sunt prognozate temperaturi maxime în intervalul 35–40°C. Aceste valori vor avea un impact negativ asupra înfloririi și fertilizării la culturile legumicole din producția târzie (castraveți, fasole verde, dovlecei).

Condițiile meteorologice din cursul lunii vor limita dezvoltarea bolilor fungice, cu excepția manei pulverulente la culturile legumicole, pomii fructiferi și viță de vie. Se așteaptă o creștere a populațiilor de acarieni. În livezi, este necesar să se monitorizeze densitatea omizilor generației a treia a moliei strugurilor. Acolo unde este necesar, tratamentele de protecție a plantelor în august trebuie efectuate în orele mai răcoroase ale zilei (la temperaturi

sub 25°C), folosind produse cu un interval de așteptare adecvat, în conformitate cu perioada de coacere a culturilor.

Sursa: INMH